



Talidomid oralt

(ex Thalidomide Celgene) kapslar/tabletter

Talidomid ska inte hanteras av kvinnor som är gravida eller i fertil ålder, då det orsakar svåra fosterskador.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapslar Thalidomide Celgene 50 mg
Tabletter Talizer 25 resp. 50 mg (licens)
Tabletter Talidex 25 mg (licens)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Om en dos under 50 mg ska ges eller om barnet har svårt att svälja tabletter/kapslar ska man i första hand förskriva licenspreparatet Talidex tabletter 25 mg. Vid sväljningssvårighet kan tabletterna lösas upp med 3 - 5 mL vatten och ges till barnet. I undantagsfall kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i första hand med vatten och undantagsvis med en sked mat (t ex sylt, yoghurt). All hantering ska ske inne i en plastpåse om tillgång till dragskåp saknas. Sjuksköterskan uppmanas att ha på sig skyddsutrustning enligt lokal rutin vid hantering av anticancerläkemedel.

Talidomid tas med fördel till natten, helst på tom mage. Om patienten har en känslig mage kan talidomid tas i samband med mat.

Oralt

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Medulloblastom

Barn 1 mån - 18 år: 3 mg/kg x 1, max 200 mg/dygn

Diffusa tumörer i hjärnstammen samt i talamus

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 1 mg/kg x 1 - 2, dygnsdosen titreras vid behov upp med 1 mg/kg/dygn varje vecka. Max 6 mg/kg/dygn

Kronisk graft vs host sjukdom (ej förstahandsval)

Barn 2 - 18 år: Initialt 3 - 6 mg/kg x 2 - 4. Dosen kan justeras varannan vecka beroende på patientens respons.

Inflammatorisk tarmsjukdom (ej förstahandsval)

Barn 1 - 18 år: 1,5 - 2 mg/kg x 1

Systemisk juvenil idiopatisk artrit (ej förstahandsval)

Barn 3 - 18 år: Initialt 2 mg/kg x 1, vid behov kan dosen ökas varannan vecka till 3 - 5 mg/kg x 1

Kutant erythema nodosum leprosum - Knölros (ej förstahandsval)

Barn 12 - 18 år (oavsett vikt): Initialt 100 - 300 mg x 1, max 400 mg/dygn.
För barn under 50 kg bör den lägre doseringen väljas.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Protokoll BIOMEDE

Biological Medicine for Diffuse Intrinsic Pontine Glioma (DIPG) Eradication

Protokoll MEMMAT

Medulloblastoma European Multitarget Metronomic Anti-Angiogenic Trial

PubMed PMID Review of thalidomide use in the pediatric population

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25617013>





Talidomid oralt

(ex Thalidomide Celgene) kapslar/tabletter

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Talidex (licensprodukt)

25 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

Talizer (licensprodukt)

25 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även 50 mg.

Thalidomide (registrerad produkt)

50 mg, KAPSLAR

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-04-01

ePedID: 4981

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-04-03

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-04-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT