



## cefADROXil oralt

(ex Cefamox löslig) kapsel/tablett

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel 500 mg (ex Cefadroxil Mylan)  
Löslig tablett 1 g (Cefamox löslig)

Cefadroxil finns även som oral suspension 100 mg/mL, se annan instruktion.

### ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Cefalosporiner kan vid inandning och hudkontakt ge allergiska reaktioner.

### ADMINISTRERING

Cefadroxil bör tas tillsammans med mat.

Kapseln ska sväljas hel.

Den lösliga tablett kan delas i två lika stora doser. Den lösliga tablett löses i ett halvt glas vatten under omrörning. Tablett löser sig snabbare om den först krossas.

Oralt

Enteralt:

Använd löslig tablett alternativt oral suspension, se annan instruktion.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Cefadroxil (registrerad produkt)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.

Löslig tablett

Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackningen, fukt känsligt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Cefadroxil ska användas RESTRIKTIVT för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Kapseln/tabletten är lämpliga att använda till barn över 40 kg.

#### Urinvägsinfektion utan feber

Behandlingen påbörjas innan resistensbesked finns.

Barn över 2 år: 12,5 mg/kg x 2, max 500 mg/DOS

Behandlingstid: 5 dagar

#### Recidiv av streptokocktonsillit

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/DOS

Behandlingstid: 10 dagar

#### Sårinfektion inkl. utbredd impetigo (2:a handsval)

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/DOS

Behandlingstid: 7 dagar

#### Uppföljande peroral behandling vid skeletinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 2, max 1000 mg/DOS

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: minst 4 veckor



## cefADROXil oralt

(ex Cefamox löslig) kapsel/tablett



### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<https://klokalistan.se/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Micromedex

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

---

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4983](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4983)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4983

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-11-21

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**