



Cefadroxil oralt

(ex Cefamox löslig) kapsel/tablett

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel 500 mg (ex Cefadroxil Mylan)
Löslig tablett 1 g (Cefamox löslig)

Cefadroxil finns även som oral suspension 100 mg/mL, se annan instruktion.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Cefalosporiner kan vid inandning och hudkontakt ge allergiska reaktioner.

ADMINISTRERING

Cefadroxil bör tas tillsammans med mat.

Kapseln ska sväljas hel.

Den lösliga tablett kan delas i två lika stora doser. Den lösliga tablett löses i ett halvt glas vatten under omrörning. Tablett löser sig snabbare om den först krossas.

Oralt

Enteralt:

Använd löslig tablett alternativt oral suspension, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Cefadroxil (registrerad produkt)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.

Löslig tablett

Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackningen, fukt känsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Cefadroxil ska användas RESTRIKTIVT för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Kapseln/tabletten är lämpliga att använda till barn över 40 kg.

Urinvägsinfektion utan feber

Behandlingen påbörjas innan resistensbesked finns.

Barn över 2 år: 12,5 mg/kg x 2, max 500 mg/DOS

Behandlingstid: 5 dagar

Recidiv av streptokocktonsillit

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/DOS

Behandlingstid: 10 dagar

Sårinfektion inkl. utbredd impetigo (2:a handsval)

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/DOS

Behandlingstid: 7 dagar





Cefadroxil oralt

(ex Cefamox löslig) kapsel/tablett

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<https://klokalistan.se/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Micromedex

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4983

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4983

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-04-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT