



Alteplas instillation 1 mg/mL

(Actilyse) i dränage

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

STEG 1

Alt. 1: Spädning från 2 mg

Alt. 2 Spädning från 10 mg

STEG 2

Beräkning av volym för instillation (NaCl 9 mg/mL + ordinerad volym alteplas 1 mg/mL)

EN-STEGSSPÄDNING

STEG 1, alt. 1

Actilyse		Sterilt Vatten		INF
2 mg				1 mg/mL
1 st	+	2,2 mL	=	2,2 mL

Beredningsinstruktion:

Injektionsflaskan 2 mg är överfylld med pulver och därför blir koncentrationen 1 mg/mL.

STEG 2 - volym för instillation

Barn under 10 kg: Ordinerad volym av alteplas 1 mg/mL + 10 mL NaCl 9 mg/mL

Barn från 10 kg: Ordinerad volym av alteplas 1 mg/mL + 40 mL NaCl 9 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING

STEG 1, alt. 2

Actilyse		Medföljande vätska		INF
10 mg				1 mg/mL
1 st	+	10 mL	=	10 mL

Beredningsinstruktion:

STEG 2 - volym för instillation

Barn under 10 kg: Ordinerad volym av alteplas 1 mg/mL + 10 mL NaCl 9 mg/mL

Barn från 10 kg: Ordinerad volym av alteplas 1 mg/mL + 40 mL NaCl 9 mg/mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Trombolytisk behandling av ockluderat dränage

Barn: 0,05 mg/kg x 2

Behandlingstid: 3 dygn

ÖVRIG INFORMATION

Vid dubbellumenkateter där båda skänklarna är ockluderade, behandla en skänkel i taget.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4986

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-03-12

ePedID: 4986

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-24

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-03-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Alteplas instillation 1 mg/mL

(Actilyse) i dränage

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös instillation: Dränaget klampas på båda sidor kopplingen och kopplas isär. Lösningen infunderas i thorax varefter dränaget återigen sammankopplas men hålls stängt under 3 timmar. Öppna därefter till sug i 9 timmar varefter proceduren upprepas (sammanlagt 6 gånger dvs 3 dygn).

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Actilyse (registrerad produkt)

10 mg, Pulver & vätska till inj/inf

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Ljuskänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

1 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 8 tim i rumstemp, 24 tim i kylskåp.

2 mg, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.