



## Remdesivir intravenös inf (Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av pulver till infusionskoncentrat 5 mg/mL i fast volym spädningsvätska.

STEG 1: lös upp pulvret

STEG 2: späd vidare fast dos av koncentrat till slutvolym 100 mL

### STAMLÖSNING

#### Ska spädas vidare

Remdesivir		Sterilt Vatten		SKA SPÄDAS VIDARE
100 mg				<b>5 mg/mL</b>
1 st	+	19 mL	=	20 mL

#### Beredningsinstruktion:

STEG 1: Tillför det sterila vattnet och skaka ampullen i 30 sek. Låt sedan ampullen stå i 2 - 3 min, det ska bli en klar lösning. Om lösningen inte är klar upprepas proceduren (skaka 30 sek, låta stå i 2 - 3 min) tills lösningen är klar.

STEG 2: Använd infusionspåse/flaska innehållande 100 mL NaCl 9 mg/mL. Dra ut den volym NaCl som motsvarar volym remdesivir som ska tillsättas. Slutvolymen ska bli 100 mL.

Dos	Volym NaCl att dra ut	Volym remdesivir som tillsätts
100 mg (1 ampull)	20 mL	20 mL
200 mg (2 ampuller)	40 mL	40 mL

Vänd påsen/flaskan ungefär 20 gånger för att blanda lösningen ordentligt. Skaka inte.

### ADMINISTRERING

Intravenös infusion: 30 - 120 min

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska endast ges till inneliggande patienter som kan övervakas noggrant.

#### COVID-19 med lunginflammation och som kräver extra syrgas

Barn 12 - 18 år, och från 40 kg:

Dag 1: 200 mg x 1

Från dag 2: 100 mg x 1

Överväg att avsluta behandlingen om ingen förbättring ses efter 48 tim.

Behandlingstid: minst 5 dagar, men inte mer än 10 dagar

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4987

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-02-02

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**





## Remdesivir intravenös inf

(Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Remdesivir (registrerad produkt)

100 mg, Pulver till infusionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur.

5 mg/mL, Stamlösning

Sparas ej, dosen tillsätts till spädningsvätska.

#### Remdesivir färdigblandad infusionslösning (från registrerad produkt)

1 st, Infusionsvätska, lösning

Färdigspädd lösning är hållbar 12 tim i rumstemperatur eller 24 tim i kylskåp.

Enligt företaget är lösningen kemiskt stabil i 24 tim i rumstemp eller 48 tim i

kylskåp, men hållbarheten är satt utifrån mikrobiell hållbarhet enl. Svensk

läkemedelsstandard.