



## Remdesivir intravenös inf

(Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska, barn från 40 kg

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av inf.koncentrat 5 mg/mL i fast volym spädningsvätska.

STEG 1: lös upp pulvret

STEG 2: späd vidare fast dos av koncentrat till slutvolym 100 mL

Till barn under 40 kg ska remdesivir spädas till fast slutkoncentration, se annan instruktion.

### ADMINISTRERING

Intravenös infusion: 30 - 120 min

Överkänslighetsreaktioner, inklusive infusionsrelaterade och anafylaktiska reaktioner, kan förekomma under och efter administreringen. En längre infusionstid, dock max 120 min, kan övervägas för att minska risken för sådana reaktioner.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Remdesivir (registrerad produkt)

100 mg, Pulver till infusionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur.

5 mg/mL, Stamlösning

Sparas ej, dosen tillsätts till spädningsvätska.

#### Remdesivir färdigblandad infusionslösning (från registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

Färdigspädd lösning är hållbar 12 tim i rumstemp eller 24 tim i kylskåp. Enligt företaget är lösningen kemiskt stabil i 24 tim i rumstemp eller 48 tim i kylskåp, men hållbarheten är satt utifrån mikrobiell hållbarhet enl. Svensk läkemedelsstandard.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska endast ges till ineliggande patienter som kan övervakas noggrant.

#### COVID-19 med lunginflammation och som kräver extra syrgas

Nyfödda och barn under 3,5 kg:

Dag 1: laddningsdos 2,5 mg/kg

Från dag 2: 1,25 mg/kg x 1

Nyfödda och barn 3,5 - 39 kg:

Dag 1: laddningsdos 5 mg/kg

Från dag 2: 2,5 mg/kg x 1

Barn från 40 kg:

Dag 1: laddningsdos 200 mg

Från dag 2: 100 mg x 1

Överväg att avsluta behandlingen om ingen förbättring ses inom 48 tim.

Behandlingstid: minst 5 dagar, men max 10 dagar

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress FDA - Emergency use authorization (EUA) of Veklury

<https://www.fda.gov/media/137566/download>

Rekommendation , (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

UpToDate

<http://www.uptodate.com>



## Remdesivir intravenös inf

(Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska, barn från 40 kg



### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

ePedID: 4987

Versionsnummer, major: 6

Giltig fr o m: 2022-03-23

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**