



# Hydroxiklorokin oralt 200 mg

(Plaquenil) tablett

Kan förlänga QT-intervallet, se Övrig information.

## ARBETSMILJÖ

Möjlig risk för fosterskador, hantera enligt lokal rutin. Krossning av tablett bör inte göras av gravida. Övriga bör använda skyddshandskar.

## ADMINISTRERING

Tas under eller direkt efter måltid. Tabletten saknar brytskåra.

Oralt:

Vid sväljsvårigheter kan tabletten krossas och slammas upp i vatten eller blandas med ex yoghurt eller äppelmos i direkt anslutning till administreringen. Krossad tablett har mycket bitter smak.

Enteralt:

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen. Krossningen bör göras noggrant, annars kan bitar av drageringen orsaka stopp.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Plaquenil (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Juvenil systemisk lupus erytematosus (jSLE)

Barn från 6 år (eller ca 35 kg): 5 - 6 mg/kg x 1, max 400 mg x 1

Ögonkontroll bör genomföras vid behandlingsstart samt efter ca 5 års behandling för att utesluta retinala förändringar och bedöma synskärpa och färgseende.

## ÖVRIG INFORMATION

Hydroxiklorokin kan ge QT-förlängning, vilket ökar risken för t.ex. torsade de pointes. Förlängningen är dosberoende och hydroxiklorokin ska ges med försiktighet till patienter med andra riskfaktorer för QT-förlängning (ex andra QT-förlängande läkemedel).

Hydroxiklorokin kan ge upphov till svår hypoglykemi.

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Internetadress Svensk Reumatologisk Förening - Ögonkontroller vid behandling med klorokinpreparat

<https://riktlinjer.svenskreumatologi.se/riktlinjer-och-rekommendationer/ogonkontroller-vid-behandling-med-klorokinpreparat/>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnreumatologisk förening - Juvenil systemisk lupus erytematosus (jSLE), nationellt vårdprogram

<https://reuma.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>



# Hydroxiklorokin oralt 200 mg (Plaquenil) tablett



## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4989

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-02-20

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**