



# Hydroxiklorokin oralt 200 mg

(Plaquenil) tablett

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tas under eller direkt efter måltid. Tabletten är inte delbar.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

**Plaquenil (registrerad produkt)**

200 mg, Filmragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 1, max 400 mg/DYGN

### Profylax mot malaria

Doseras en gång per vecka

Barn 1 mån - 18 år: 6,5 mg/kg, max 400 mg/DOS

Behandling bör börja en vecka före ankomst till område med malaria och fortsätta i 4 - 8 veckor efter avresa från det området.

### Behandling av malaria

Barn 1 mån - 18 år:

En totaldos om max 2000 mg administreras under 3 dagar enligt följande:

Dos 1: 13 mg/kg, max 800 mg

Dos 2: 6,5 mg/kg, max 400 mg, 6 tim efter dos 1

Dos 3: 6,5 mg/kg, max 400 mg, 18 tim efter dos 2

Dos 4: 6,5 mg/kg, max 400 mg, 24 tim efter dos 3

## ÖVRIG INFORMATION

Preparatet kan ge QT-förlängning, försiktighet speciellt i kombination med andra läkemedel som kan ge QT-förlängning.

Hydroxiklorokin kan ge upphov till svår hypoglykemi.

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Rekommendation (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-06-01

ePedID: 4989

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-06-02

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-06-02

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**

ePedID: 4989.2 Giltig fr o m: 2020-06-02

Versionshantering: [http://eped.sl.sjunet.org/eped/instructions/show\\_instruction\\_4989.html](http://eped.sl.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_4989.html)