



Plasmalyte Glucos intravenös inf (+ 35 K)

vid diabetes ketoacidosis

OBS! Använd Addex-Kalium, inte Addex-Kaliumklorid.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Plasmalyte Glucos intravenös inf vätska med extra tillsats av K till totalt 40 mmol/L.
(Plasmalyte Glucos innehåller 140 mmol Na/L och 5 mmol K/L.)

För behandling av diabetes ketoacidosis.

Tillsatser som ger Plasmalyte Glucos intravenös inf (+ 35 K)

Plasmalyte-GLUCOS	1000 mL
Addex-Kalium 2 mmol/mL	17,5 mL

Beredningsinstruktion:

35 mmol (17,5 mL) Addex-Kalium sätts till 1000 mL Plasmalyte Glucos (ger totalt 40 mmol K per liter).

OBS! Använd Addex-Kalium, inte Addex-Kaliumklorid.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Diabetes ketoacidosis, långsam rehydrering om P-glukos sjunker mer än 5 mmol/L/tim

10 % av kroppsvikten ges på 48 tim.

Volym dygn 1: 5 % av kroppsvikten + underhåll (medeldos) under 24 tim.

Volym dygn 2: 5 % av kroppsvikten + underhåll (medeldos) under 24 tim.

Tillsätt 35 mmol K/L.

Om P-glukos sjunker mer än 8 mmol/L/tim byt till glukos 100 mg/mL.

ÖVRIG INFORMATION

Den snabba rehydreringsvolymen avräknas inte från vätskemängden som ges under 48 tim.

Addex-Kaliumklorid ska ej användas pga risk för hyperkloremisk acidosis.

REFERENS/LÄNK

Bok Akutpediatrikboken, åttonde upplagan

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sil.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4992

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-05-29

ePedID: 4992

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-06-03

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-06-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN Kopia ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Plasmalyte Glucos intravenös inf (+ 35 K)

vid diabetes ketoacidosis

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Addex-Kalium (registrerad produkt)

2 mmol/mL, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Öppnad förpackning bör förvaras åtskild från andra elektrolytlösningar och spädningsvätskor för att undvika förväxling. Öppnad förpackning får ej sparas pga förväxlingsrisk.

Plasmalyte-GLUCOS (registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.