



Pyridoxin oralt 10 mg/mL

(Vitamin B6, Extempore) oral vätska

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Pyridoxin APL oral vätska 10 mg/mL (extempore, ej lagervara)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Pyridoxin oralt 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
7,5 mg/kg	-	3,75 mL	7,5 mL	37,5 mL
10 mg/kg	-	5 mL	10 mL	50 mL
25 mg/kg	2,5 mL	12,5 mL	25 mL	125 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Pyridoxin (extempore - ej lagervara)

10 mg/mL, Oral vätska

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Flaskan är hållbar 28 dagar efter tillverkningsdatum, oavsett om den är öppnad eller öppnad.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Neonatal epileptisk encefalopati eller terapiresistent epilepsi under första 3 levnadsåren inkl. infantil spasm/West syndrom

- av oklar orsak
- efter perinatal asfyxi eller prematuritet, svårbehandlad

Provbehandling:

Som steg 2 efter intravenös behandling eller som steg 1 om status epilepticus eller hysarytmi inte föreligger:

Nyfödda: 25 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 3 år: 25 mg/kg x 2

Om ej god effekt inom 3 dygn: byte till pyridoxal-5-fosfat (se annan instruktion)
Om god effekt: fortsatt behandling i väntan på utredningsresultat

Kombineras lämpligen med folinsyra.

Klassisk pyridoxinberoende epilepsi (ALDH7A1 mutation)

Barn 1 mån - 18 år: 7,5 - 15 (- 30) mg/kg x 2

Kombineras lämpligen med folinsyra.

PNPO-brist/pyridoxalberoende epilepsi (PNPO mutation)

Behandlas i första hand med pyridoxal-5-fosfat (se annan instruktion), men enstaka patienter svarar bättre på pyridoxin:

Barn 1 mån - 18 år: 7,5 - 15 (- 30) mg/kg x 2

Profylax mot isoniazid-inducerad neuropati

Barn 1 mån - 10 år: 10 mg pyridoxin per 100 mg isoniazid x 1

Barn över 10 år: 40 mg x 1 (4 mL x 1)

Särskilt viktigt med behandling till spädbarn som ammas samt tonåringar.

Behandlingstid: vanligen 2 mån



Pyridoxin oralt 10 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral vätska



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Zschocke J, Hoffmann GF. Vademecum metabolicum, diagnosis and treatment of inborn errors of metabolism. Tredje utgåvan 2011.

Neonatal Formulary

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5002

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-06-23

ePedID: 5002

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-06-30

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-06-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT