



Granisetron oralt

(f.d Kytril) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 1 och 2 mg

ADMINISTRERING

Första dosen ges en timme innan påbörjad cytostatikabehandling.

Tabletterna har ingen brytskåra och bör inte delas då dosnoggrannheten blir osäker.

Tabletterna kan slamas upp för att underlätta nedsväljning. Tabletterna läggs då med fördel i en oral spruta, dra sedan upp så liten mängd vatten som möjligt och skaka i cirka 5 min för att få tabletterna i lösning.

Oralt

Enteralt: Läkemedlet löser upp sig efter cirka 5 min. Granisetron kan administreras i sond med storlek från 8 Fr.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Granisetron (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i originalförpackningen i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Tabletterna har ingen brytskåra och bör inte delas då dosnoggrannheten blir osäker.

Profylax och behandling av cytostatikaorsakat illamående och kräkningar (bristande evidens)

Låg och medelhög emetogen risk:

Barn: 40 MIKROG/kg x 2 (0,04 mg/kg x 2)

ÖVRIG INFORMATION

För cytostatika som ger hög emetogen risk (tex Cisplatin) rekommenderas behandling med intravenöst granisetron eller intravenöst/peroralt palonosetron.

Vid behandling/profylax med granisetron under två eller flera dagar i följd rekommenderas istället intravenöst palonosetron.

Granisetron är en specifik 5 HT₃- antagonist som blockerar specifika serotoninreceptorer i hjärnan och gastrointestinaltrakten och ger ofta huvudvärk och förstoppning som biverkan.

Ingen maxdos finns studerad för den orala beredningsformen, för den intravenösa





Granisetron oralt

(f.d Kytril) tabletter

REFERENS/LÄNK

Artikel Antiemetic medication for prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in childhood

<https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007786.pub3/full>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Guideline for the prevention of acute nausea and vomiting due to antineoplastic medication in pediatric cancer patients

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pbc.24508>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Pediatrisk hematologi och onkologi - Profylax mot illamående och kräkningar (CINV-profylax)

<https://pho.barnlakarforeningen.se/vardprogram-pho/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5011

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi

ePedID: 5011

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-10-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT