



Natriumklorid + Glukos intravenös inf 4,5 + 25 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING

Natriumklorid 9 mg/mL 25 mL	+	Glukos 50 mg/mL 25 mL	=	INF 4,5 + 25 mg/mL 50 mL
-----------------------------------	---	--------------------------	---	---------------------------------------

Beredningsinstruktion:

Spädning av 25 mL isoton Natriumklorid 9 mg/mL med 25 mL Glukos 50 mg/mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion (kontinuerlig)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Natriumklorid + Glukos (från registrerad produkt)

4,5 + 25 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Som infusion vid sidan av TPN för att uppnå ordinerad dygnsvolym vätska

Individuell dosering

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2020-08-03

ePedID: 5013

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-07

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-10-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT