



## Etakrynsyra intravenös inj 2,5 mg/mL

(Reomax licens)

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Denna spädning gäller endast Reomax pulver till injektionsvätska 50 mg (licens).

Edecrin ska spädas till slutkoncentration 1 mg/mL, se annan instruktion.

### EN-STEGSSPÄDNING

Reomax		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		INJ LÖ
50 mg	+	mg/mL	=	<b>2,5 mg/mL</b>
1 st		20 mL		20 mL

#### Beredningsinstruktion:

Medföljande vätskeampull innehåller 20 mL glukos 50 mg/mL.

Lösningen kan bli grumlig vid spädning i glukos 50 mg/mL. Detta beror på att vissa glukoslösningar kan ha pH under 5. Grumliga lösningar ska kasseras och inte användas.

### ADMINISTRERING

Intravenös injektion/infusion: Ges som långsam injektion alternativt som kort infusion på minst 5 - 10 min.

Vid upprepad dos i perifer infart kan det finnas behov av att byta injektionsställe för att undvika tromboflebit.

### RIMLIG DOS för Etakrynsyra intravenös inj 2,5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg	0,4 mL	2 mL	4 mL	20 mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Reomax (licensprodukt)

50 mg, Pulver till injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur.

2,5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Hjärtsvikt, njursvikt, oliguri

Ordineras i samråd med specialist. Ges normalt inte till barn under 1 års ålder.

Barn 1 - 18 år: 0,5 - 1 mg/kg x 1 (- 3), max 3 mg/kg/DYGN

Upprepade doser rekommenderas vanligen inte. Vid behov kan dock dosen upprepas var 8 - 12:e tim.

Till vuxna ges vanligen 50 mg/DOS, i allvarliga fall har doser upp till 100 mg/DOS förekommit.

### REFERENS/LÄNK

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Miller JL et al. Ethacrynic acid continuous infusions in critically ill pediatric patients.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24782692>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Summary of Product Characteristics (SPC) Reomax 50 mg/20 mL

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-12-13

ePedID: 5014

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-12-15

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2021-12-15

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**