



Droperidol intravenös inj 0,125 mg/mL = 125 mikrog/mL

(ex Dridol)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning från droperidol 2,5 mg/mL

Denna spädning lämpar sig bäst för doser under 30 mikrog/kg och/eller för mindre barn (under ca 20 kg). För högre doser och större barn, se annan instruktion.

EN-STEGSSPÄDNING

Droperidol		NaCl 9 mg/mL alt		INJ LÖ
2,5 mg/mL	+	Glukos 50 mg/mL	=	0,125 mg/mL
1 mL		19 mL		20 mL

ADMINISTRERING

Långsam intravenös injektion: 2 - 5 min

Ges 30 min före förväntat operationsslut.

RIMLIG DOS för Droperidol intravenös inj 0,125 mg/mL = 125 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mikrog/kg	-	-	0,8 mL	4 mL
30 mikrog/kg	-	-	2,4 mL	-
50 mikrog/kg	-	-	4 mL	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Droperidol (registrerad produkt)

2,5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten ampull får ej sparas.

0,125 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkningar (PONV), inte förstahandsval

Barn 2 - 18 år: 10 - 50 MIKROG/kg = 0,01 - 0,05 mg/kg

Max 1,25 mg/DOS

Dosen kan upprepas var 6:e timme vid behov.

ÖVRIG INFORMATION

Droperidol är ett neuroleptikum som blockerar dopaminreceptorer i kemotriggerzonen.

Kontraindicerat vid hypokalemi eller hypomagnesi, bradykardi och svår depression.

Risk för QT-förlängning vid elektrolytrubbning.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5021

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-06-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT