



## Hydrokortison oralt 0,5 mg/mL

(Extempore) oral lösning från kapsel

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel med valfri styrka och med laktos som bärarsubstans (extempore)

Instruktionen är mest lämpad för mindre barn. För större barn, se annan instruktion.

### EN-STEGSSPÄDNING

Hydrokortison APL		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
2,5 mg				
	+		=	<b>0,5 mg/mL</b>
1 st		5 mL		5 mL

#### Beredningsinstruktion:

Öppna kapseln och lös upp innehållet med sterilt vatten.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

### RIMLIG DOS UTIFRÅN KROPPSYTA

	0,1 m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>	0,5 m <sup>2</sup>	1,5 m <sup>2</sup>
3 mg/m <sup>2</sup>	0,6 mL	1,5 mL	-	-
7 mg/m <sup>2</sup>	1,4 mL	3,5 mL	-	-
10 mg/m <sup>2</sup>	2 mL	5 mL	-	-

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Hydrokortison APL (extempore)

2,5 mg, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller samtliga styrkor.

0,5 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Substitutionsbehandling vid kongenital binjurebarkshyperplasi, där intravenös tillförsel inte anses nödvändig

Vid diagnos

Nyfödda: 7 - 10 mg/m<sup>2</sup> x 3

Barn 1 mån - 18 år: 3 - 5 mg/m<sup>2</sup> x 3

Underhållsdos

Nyfödda: 3 - 5 mg/m<sup>2</sup> x 3

Barn 1 mån - 18 år: 3 - 5 mg/m<sup>2</sup> x 3

Justera dosen utifrån respons.

Doshöjning vid feber eller annan fysisk stress

Under 36,5 °C misstänk hypoglykemi: Dubblera patientens dygnsdos och fördela på 3 - 6 tillfällen.

Över 38 °C eller motsvarande stress: Dubblera patientens dygnsdos och fördela på 3 - 6 tillfällen.

Över 39 °C eller stark stress (t ex. trauma): Tredubbla patientens dygnsdos och fördela på 3 - 6 tillfällen.

#### Binjurebarksinsufficiens

Nyfödda: 2,5 - 3,5 mg/m<sup>2</sup> x 3

Barn 1 mån - 18 år: 2,5 - 3,5 mg/m<sup>2</sup> x 3

### ÖVRIG INFORMATION

Kan vid långvarig användning orsaka glaukom och katarakt. Kontraindicerad vid tuberkulos. Vacciner med levande/försvagat virus eller bakterier bör ej ges vid samtidig behandling med hydrokortison. Undvik att träffa personer med mässling eller varicella.

Extemporekapslar innehåller laktos och är lösliga i vatten.



## Hydrokortison oralt 0,5 mg/mL

(Extempore) oral lösning från kapsel



### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

PubMed PMID Accuracy of Hydrocortisone Dose Administration via Nasogastric Tube

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30311954/>

Svenska Barnläkarföreningen för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes - Vårdprogram för kongenital binjurebarkhyperplasi (CAH)

[http://endodiab.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/9/2015/02/VP\\_2016-CAH.pdf](http://endodiab.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/9/2015/02/VP_2016-CAH.pdf)

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#5030](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5030)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-09-23

ePedID: 5030

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-06

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-10-06

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**