



Terbutalin intravenös inf 20 mikrog/mL

(Bricanyl)

EN-STEGSSPÄDNING

Bricanyl		Glukos 50 mg/mL		INF
0,5 mg/mL				20 mikrog/mL
1 mL	+	24 mL	=	25 mL

ADMINISTRERING

Alternativ till kontinuerlig nebulisering för barn 1 mån - 5 år

Intravenös infusion (kontinuerlig)

RIMLIG DOS för Terbutalin intravenös inf 20 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
3 mikrog/kg/tim	-	0,75 mL/tim	1,5 mL/tim	7,5 mL/tim
5 mikrog/kg/tim	-	1,25 mL/tim	2,5 mL/tim	12,5 mL/tim

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Bricanyl (registrerad produkt)

0,5 mg/mL, Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning

Förvaras i ytterförpackningen, ljuskänsligt. Förvaras vid högst 25 °C. Bruten ampull får inte sparas.

20 mikrog/mL, Infusionsvätska, lösning

Färdigspädd lösning hållbar 12 tim i rumstemp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Akut astma - tilläggsbehandling till patient som inte svarat på luftrörsvidgande behandling och kortison

Barn 1 mån - 5 år: 3 - 6 mikrog/kg/tim

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi - Akut astma behandling (D9)

https://aol.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/24/2020/07/d9_Akut_astma.pdf

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5054

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-03-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT