



Nutrilock instillation

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös instillation:

Innan instillation ska accessystemet spolas med NaCl 9 mg/mL. Mängd: 1 - 2 mL/kg, max 40 mL.

Instillera därefter Nutrilock långsamt i subkutan venport (SVP) alt. central venkateter (CVK):

- barn under 2 år inte snabbare än 1 mL/5 sek
- barn från 2 år inte snabbare än 1 mL/sek

Innan start av ny behandling bör Nutrilock aspireras och systemet spolas med 10 mL NaCl 9 mg/mL. Om aspirering inte är möjlig får lösningen spolas in långsamt, max 1 mL/3 sek.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Nutrilock (medicinteknisk produkt)

Instillationsvätska

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Öppnad behållare får ej sparas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Förhindra koagelbildning samt bakterie- och svamptillväxt i central venkateter (CVK) eller subkutan venport (SVP) t. ex. till patienter med förväntad långtidsbehandling med parenteral nutrition

Instillera Nutrilock med en volym som fyller kateterskänkel/skänklar efter avslutad infusion.

Volymen beräknas individuellt utifrån antal kranar, kopplingar, förlängningskatetrar och CVK-typ (antal skänklar, storlek etc).

Max 1 gång/dygn.

Låt lösningen ligga kvar till nästa användning, dock maximalt 30 dagar.

ÖVRIG INFORMATION

Nutrilock innehåller taurolidin och är ett alternativ till patienter som inte tål citrat (som ingår i Taurolock).

REFERENS/LÄNK

Internetadress Produktinformation Taurolock, svensk hemsida

<http://transcutan.com/sv/taurolock-sv/>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-03-03

ePedID: 5105

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-03-18

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-03-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT