



## Alginsyra + tillsatser oralt

(ex Gaviscon) tuggtablett

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Tuggtablettens får inte sväljas hel utan måste tuggas för att den ska ha effekt.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

**Gaviscon (registrerad produkt)**

Tuggtablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

**Refluxesofagit**

**Gastroesofageal refluxsjukdom**

Barn 6 - 11 år: 1 tuggtablett vid behov

Barn 12 - 18 år: 1 - 3 tuggtabletter vid behov

Dos tas ca 30 min efter måltid och i samband med sänggåendet.

### ÖVRIG INFORMATION

Gaviscon kan minska absorptionen av ett flertal läkemedel, t ex tvåvärt järn genom bildning av kelatkomplex. Minst två timmars intervall mellan administreringarna rekommenderas.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Legemidler til barn (Norskt kompetansenettverk for legemidler til barn) - Gaviscon til barn

<https://www.legemidlertilbarn.no/nyheter/Sider/2016/Gaviscon-til-barn.aspx>

Rekommendation ,(Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - GERD

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-03-18

ePedID: 5107

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-03-18

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2021-03-18

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**