



Prednisolon + Cinkokain rektalt

(Scheriproct) salva/suppositorium

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Salva (1,9 mg/g prednisolonkaproat + 5 mg/g cinkokainhydroklorid)

Suppositorium (1,3 mg prednisolonkaproat + 1 mg cinkokainhydroklorid)

ADMINISTRERING

Rektalt:

Salva: Tunt lager påstrykes lokalt, kan användas inför smärtsamma tarmtömningar.

Suppositorium: Appliceras efter tarmtömning.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Scheriproct (registrerad produkt)

Suppositorium

Förvaras i kylskåp. Kan förvaras vid högst 25 °C i 2 mån.

Rektalsalva

Förvaras vid högst 25 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Analfissur/hemorroid

Salva:

Barn 1 mån - 18 år: Påstrykes 1 x 2 i 5 - 7 dagar, och 1 x 1 under några dagar efter att besvären försvunnit. Vid svåra besvär kan salvan appliceras upp till 4 gånger första dagen.

Suppositorium:

Barn 12 - 18 år: 1 x 1 under högst 5 - 7 dagar. Vid svåra besvär kan 2 - 3 suppositorier ges första dagen.

ÖVRIG INFORMATION

Undvik kontakt med ögonen.

Överdriven applicering bör undvikas för att minimera risk för lokala irriterationer som hudatrofi.

Vid rektal blödning eller irritation bör behandlingen avbrytas. En lokal irritation kan bero på överkänslighet mot något av innehållsämnen.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Riktlinje för primärvården, Förstoppning hos barn

<https://vardgivare.skane.se/vardriftlinjer/medicinska-omraden/barn-och-ungdom/ako/forstoppning-hos-barn/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5111

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-02-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT