



Cocillana + Etylmorfin + Senegaextrakt oralt

(Cocillana-Etyfin) oral lösning

**Kontraindicerad till barn under 2 år på grund av risken för CNS-toxicitet.
Rekommenderas inte till barn med nedsatt andningsfunktion.**

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

Omskakas före användning.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Cocillana-Etyfin (registrerad produkt)

Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnande, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Symtomatisk korttidsbehandling av rethosta

Bristfällig evidens. Överväg noga om nyttan med behandlingen överstiger risken för biverkningar.

Bör primärt ges till natten. Dosen kan ges max 3 gånger/dygn. Minst 3 tim mellan doserna.

Dosera efter vikt om barnet väger MINDRE än angivet intervall för barnets ålder.

Dosera efter ålder om barnet väger MER än angivet intervall för barnets ålder.

Barn 2 år (13 - 15 kg): 1 mL vid behov

Barn 3 - 5 år (16 - 20 kg): 2 mL vid behov

Barn 6 - 10 år (21 - 30 kg): 2,5 mL vid behov

Barn 11 - 12 år (31 - 40 kg): 3,5 mL vid behov

Barn 13 - 18 år (från 41 kg): 5 - 10 mL vid behov

Informera vårdnadshavare att dosen bör mätas upp noggrant med lämpligt doseringsmått, vikten av att inte överskrida den rekommenderade dosen och att läkemedlet inte ska ges till andra i familjen. Välj minsta möjliga förpackning för behandlingens längden.

ÖVRIG INFORMATION

Barn är känsligare än vuxna för etylmorfinns CNS-deprimerande effekter. Bör ej kombineras med andra CNS-deprimerande läkemedel.

Kontraindicerat till patienter som är kända ultrasnabba metaboliserare avseende CYP2D6.

Etylmorfin rekommenderas inte till barn som kan ha nedsatt andningsfunktion inkluderande neuromuskulära sjukdomar, allvarliga hjärt- eller andningstillstånd, allvarliga infektioner i övre luftvägarna eller lungorna, multipelt trauma eller omfattande kirurgiska ingrepp. Dessa faktorer kan förvärra symtomen på morfinförgiftning.

1 mL innehåller flytande cocillanaextrakt 8,8 mg, senegaextrakt 7,8 mg samt etylmorfinhydroklorid 2,5 mg. Innehåller även etanol, 97,4 mg/mL.





Cocillana + Etylmorfin + Senegaextrakt oralt (Cocillana-Etyfin) oral lösning

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

janusinfo.org Knapphändig evidens för hostmediciner

<https://www.janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/>

Läkemedelsverket Nyheter, 2021, Risk för överdosering av etylmorfin till barn

<https://www.anpdm.com/article/43405D467045465C457444405B4A71/28161425/6481439>

PubMed PMID Oduwole et al. Honey for acute cough in children.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29633783>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll 2021-05-19

ePedID: 5120

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2021-06-23

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-06-23

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT