



Fomepizol intravenös inf 5 mg/mL

(Fomepizole SERB)

Behandling sker alltid i samråd med Giftinformationscentralen (GIC), tel 010- 456 67 19.

Fomepizol SERB 5 mg/mL behöver INTE SPÄDAS, trots att det anges på förpackningen.

ADMINISTRERING

Intravenös infusion: 30 minuter

RIMLIG DOS för Fomepizol intravenös inf 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
15 mg/kg (Laddningsdos)	3 mL	15 mL	30 mL	150 mL
10 mg/kg	2 mL	10 mL	20 mL	100 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fomepizol (registrerad produkt)

5 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas.

Bruten ampull bör användas direkt. Vid behov kan kvarvarande volym från bruten ampull förvaras uppdragen i märkt spruta 24 tim i kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Etylenglykol- eller metanolintoxikation

Behandling sker alltid i samråd med Giftinformationscentralen, tel 010-456 67 19.

Barn:

Laddningsdos: 15 mg/kg (3 mL/kg)

Effektduration ca 12 timmar. Om dialys påbörjas parallellt, ring GIC.

Underhållsdos: 10 mg/kg (2 mL/kg) var 12:e timme. Ring GIC om aktuellt.

ÖVRIG INFORMATION

Fomepizol hämmar enzymet alkoholdehydrogenas. Fomepizolbehandling blockerar uppkomsten av giftiga metaboliter av etylenglykol/metanol.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Giftinformationscentralen - Antidotregistret

<https://giftinformation.se/Antidot>

PubMed PMID Brent, J. Fomepizole for the treatment of pediatric ethylene and diethylene glycol, butoxyethanol, and methanol poisonings. 2010.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20586570>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll 2021-06-29

ePedID: 5121

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-06-30

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-06-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT