



Makrogol + elektrolyter oralt (Laxabon)

Kontraindicerat vid inflammatorisk tarmsjukdom, se Övrig information.

ADMINISTRERING

Innehållet i en dospåse blandas FÖRST med 5 dL ljummet vatten. Rör om ordentligt så att allt pulver löser sig. Tillsätt sedan YTTERLIGARE 5 dL vatten och rör om ordentligt igen.

Intas under 3 - 4 timmar.

Lösningen har en lite salt smak och smakar bättre om den dricks sval. Lösningen får inte smaksättas.

Oralt:

Ett snabbt intag av varje portion (t.ex ett dricksglas) rekommenderas istället för att dricka mindre volymer kontinuerligt.

Enteralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Laxabon (registrerad produkt)

Pulver till oral lösning, dospåse

Förvaras i rumstemperatur.

Oral lösning

Lösningen är hållbar 14 dagar i kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Fast föda FÅR INTE intas senare än 2 timmar innan behandling med Laxabon påbörjas. Helst bör matintag undvikas 3 - 4 timmar innan.

Tarmsköljning inför operation eller undersökning

Barn: 25 - 35 mL/kg och timme tills ett klart tarmeluat erhålls

Laxeringen bör påbörjas så nära inpå undersökningen/operationen som är praktiskt genomförbart. Efter genomförd laxering får klara drycker intas enligt lokala riktlinjer inför anestesi.

Första tarmtömning kommer ca 1 timme efter att intaget av Laxabon har börjat.

Behandling av DIOS (distalt intestinalt obstruktivt syndrom)

Ges som steg 5 i behandlingen om tidigare steg inte har haft tillräcklig effekt, se Övrig information.

Barn 1 - 18 år:

Barn 9 - 16 kg (1 - 3 år): 1 liter

Barn 17 - 23 kg (4 - 6 år): 2 liter

Barn 24 - 33 kg (7 - 9 år): 3 liter

Barn 34 - 39 kg (10 - 11 år): 3,5 liter

Barn från 40 kg (från 12 år): 4 liter

Volymen minskas vid kräkning, vilket är vanligt förekommande om tillståndet närmar sig ileus.





Makrogol + elektrolyter oralt (Laxabon)

ÖVRIG INFORMATION

Behandling med Laxabon är kontraindicerad vid intestinal perforation eller obstruktion orsakad av strukturell eller funktionell störning i tarmväggen, ileus eller svåra inflammatoriska tillstånd i tarmkanalen som t ex Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller toxisk megakolon.

Behandlingen av DIOS omfattar 5 steg:

Steg 1. Lavemang med acetylcystein + gastrografin, se annan instruktion.

Steg 2. Lavemanget med acetylcystein + gastrografin upprepas efter ca 3 - 4 timmar (minst 2 timmar).

Steg 3. Vanligt vattenlavemang, ges 3 - 4 timmar efter steg 2. Samma volym vatten som lavemanget i steg 1 respektive steg 2.

Vid otillräcklig effekt av lavemangen i steg 1 - 3:

Steg 4. Oralt amidotrizoinsyra (Gastrografin), se annan instruktion.

Steg 5. Oralt Laxabon, minst 4 timmar efter steg 4.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Arbetsgruppen för cystisk fibros - Distalt intestinalt obstruktionssyndrom (DIOS)

<http://www3.svls.se/sektioner/cf/index.php/medicinska-pm>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5170

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-12-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT