

Glukagon intranasalt 3 mg

(Baqsimi) näspulver

ADMINISTRERING

Nasalt: Dosen ges i ENA näsborren.

Engångsbehållaren innehåller endast en dos och ska inte förberedas eller testas innan administrering.

Tryck försiktigt in kolven så långt det går. Dosen har avgetts när den gröna linjen inte längre syns.

Genomsnittlig tid till maximal plasmakoncentration efter nasal administrering är 15 - 20 min.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Baqsimi (registrerad produkt)

3 mg, Näspulver

Förvaras vid högst 30 °C. När den inre förpackningen har öppnats måste endosbehållaren användas direkt.



VANLIG INDIKATION OCH DOS

Svår hypoglykemi vid diabetes mellitus

Barn 4 - 18 år, oavsett kroppsvikt: 3 mg (1 dos) i ena näsborren

När patienten svarat på behandlingen ges kolhydrater peroralt så att glykogendepån i levern återställs och återfall i hypoglykemi förhindras.

ÖVRIG INFORMATION

Kontraindicerat vid feokromocytom.

Nästappa vid förkylning påverkar inte upptaget vid nasal administrering.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Grant JS, Graven LJ. Intranasal glucagon for severe hypoglycemia.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28157777>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5176

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-05-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT