



## Ivakaftor + Tezakaftor + Elexakaftor oralt

(Kaftrio) tabletter

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 37,5 + 25 + 50 mg och 75 + 50 + 100 mg

### ADMINISTRERING

Oralt:

Tabletterna ska sväljas hela, får ej tuggas, krossas eller delas. Ska tas tillsammans med mat som innehåller fett.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Kaftrio (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordineras av cystisk fibros-läkare.

#### Cystisk fibros, kombinationsbehandling vid minst en F508del-mutation

Ges i kombination med ivakaftor (Kalydeco).

Barn 6 - 11 år, under 30 kg: 75 + 50 + 100 mg x 1

Barn 6 - 11 år, från 30 kg: 150 + 100 + 200 mg mg x 1

Barn 12 - 18 år: 150 + 100 + 200 mg x 1

Dosen tas på morgonen tillsammans med mat som innehåller fett.

Dosintaget ska vara så nära 12 timmars mellanrum från dosen Kalydeco som tas på kvällen.

### ÖVRIG INFORMATION

Vid samtidig behandling med läkemedel som är måttliga eller starka CYP3A-hämmare ska dosen Kaftrio sänkas, se produktresumé.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Mall M A et al. Efficacy and Safety of Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor in Children 6 Through 11 Years of Age with Cystic Fibrosis Heterozygous for F508del and a Minimal Function Mutation: A Phase 3b, Randomized, Placebo-controlled Study

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35816621>

Rekommendation , (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5183

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-12-06

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**