



## Ivakaftor + Tezakaftor + Elexakaftor oralt

(Kaftrio) tabletter

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 37,5 + 25 + 50 mg och 75 + 50 + 100 mg

### ADMINISTRERING

Oralt:

Tabletterna ska sväljas hela, får ej tuggas, krossas eller delas. Ska tas tillsammans med mat som innehåller fett.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Kaftrio (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordineras av cystisk fibros-läkare.

#### Cystisk fibros, kombinationsbehandling vid minst en F508del-mutation

Ges i kombination med ivakaftor (Kalydeco) som tas på kvällen, se annan instruktion. Doserna tas med så nära 12 timmars mellanrum som möjligt.

Dosen Kaftrio tas på morgonen tillsammans med mat som innehåller fett.

Barn 6 - 11 år, under 30 kg: 75 + 50 + 100 mg x 1

Barn 6 - 11 år, från 30 kg: 150 + 100 + 200 mg x 1

Barn 12 - 18 år: 150 + 100 + 200 mg x 1

### ÖVRIG INFORMATION

Vid samtidig behandling med läkemedel som är måttliga eller starka CYP3A-hämmare ska dosen Kaftrio sänkas, se produktresumé.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Mall M A et al. Efficacy and Safety of Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor in Children 6 Through 11 Years of Age with Cystic Fibrosis Heterozygous for F508del and a Minimal Function Mutation: A Phase 3b, Randomized, Placebo-controlled Study

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35816621>

Rekommendation , (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5183

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-12-20

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**