



## Ivakaftor + Tezakaftor + Elexakaftor oralt

(Kaftrio) tabletter/granulat

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 37,5 mg ivakaftor + 25 mg tezakaftor + 50 mg elexakaftor  
Tablett 75 mg ivakaftor + 50 mg tezakaftor + 100 mg elexakaftor  
Granulat i dospåse 60 mg ivakaftor + 40 mg tezakaftor + 80 mg elexakaftor  
Granulat i dospåse 75 mg ivakaftor + 50 mg tezakaftor + 100 mg elexakaftor

### ADMINISTRERING

Oralt:  
Ska tas tillsammans med mat som innehåller fett.

Tabletterna ska sväljas hela, får ej tuggas, krossas eller delas.

Granulatet i en dospåse ska blandas med 5 mL mjuk mat eller vätska som är rumstempererad eller svalare. Blandningen bör intas direkt, senast 1 timme efter iordningställandet.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Kaftrio (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

Granulat, dospåse

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna. När granulatet har blandats med mjuk mat eller vätska ska det intas senast 1 tim efter iordningställandet.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordineras av specialistläkare väl insatt i behandling av cystisk fibros.

#### Cystisk fibros, kombinationsbehandling med Kalydeco vid minst en F508del-mutation

Doserna tas med så nära 12 timmars mellanrum som möjligt.

Dosen Kaftrio tas på morgonen tillsammans med mat som innehåller fett.

Granulat

Barn 2 - 6 år, under 14 kg: 60 + 40 + 80 mg x 1

Barn 2 - 6 år, från 14 kg: 75 + 50 + 100 mg x 1

Tabletter

Barn 6 - 11 år, under 30 kg: 75 + 50 + 100 mg x 1

Barn 6 - 11 år, från 30 kg: 150 + 100 + 200 mg x 1

Barn 12 - 18 år: 150 + 100 + 200 mg x 1

Ges i kombination med ivakaftor (Kalydeco) som tas på kvällen, se annan instruktion.

### ÖVRIG INFORMATION

Vid samtidig behandling med läkemedel som är måttliga eller starka CYP3A-hämmare (inkl. johannesört) ska dosen Kaftrio sänkas, se produktresumé. Mat och dryck innehållande grapefrukt ska undvikas.





## Ivakaftor + Tezakaftor + Elexakaftor oralt

(Kaftrio) tabletter/granulat

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Mall M A et al. Efficacy and Safety of Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor in Children 6 Through 11 Years of Age with Cystic Fibrosis Heterozygous for F508del and a Minimal Function Mutation: A Phase 3b, Randomized, Placebo-controlled Study

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35816621>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5183

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-03-05

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**