



Biktegravir + Emtricitabin + Tenofoviralfenamid 50 + 200 + 25 mg

(Biktarvy) tablett

ADMINISTRERING

Biktarvy bör ges minst 2 tim före eller tillsammans med mat 2 tim efter syraneutraliserande medel som innehåller magnesium och/eller aluminium. Biktarvy bör även ges minst 2 tim före järntillskott, alternativt kan de ges samtidigt men då ihop med mat.

Oralt:

Tabletten får inte tuggas, krossas, delas eller lösas upp.

Entertalt:

Tabletten är inte lämplig för enteral administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Biktarvy (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen, fuktkänsligt. Tillslut burken väl. Om burkens försegling är trasig eller saknas vid första uttag ska innehållet inte användas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordineras i samråd med infektionsspecialist.

HIV-infektion

Barn 6 - 18 år, minst 25 kg: 50/200/25 mg x 1 (1 tabl x 1)

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines

<https://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/>

Internetadress RAV, Referensgruppen för antiviral terapi - Antiretroviral behandling av HIV-infektion

<http://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5199

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-10-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT