



Biktegravir + Emtricitabin + Tenofoviralfenamid

(Biktarvy) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 30 mg biktegravir + 120 mg emtricitabin + 15 mg tenofoviralfenamid

Tablett 50 mg biktegravir + 200 mg emtricitabin + 25 mg tenofoviralfenamid

ADMINISTRERING

Biktarvy kan ges med eller utan mat.

Om patienten tar antacida innehållande aluminium eller magnesium bör Biktarvy tas minst 2 timmar före eller tillsammans med mat minst 2 timmar efter dessa läkemedel.

Om patienten tar järntillskott kan Biktarvy tas samtidigt som detta om intaget sker tillsammans med mat, i annat fall ska Biktarvy tas minst 2 timmar före järntillskott.

Oralt:

Tablett 30+120+15 mg har brytskåra och kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge halv dos.

Tablett 50+200+25 mg saknar brytskåra.

Tabletterna bör inte tuggas eller krossas då de har bitter smak. Krossning av tabletterna kan även leda till sämre effekt, se referens Gilead.

Entertalt:

Det finns rapporter gällande vuxna patienter att tablettens kan lösas i vatten i direkt anslutning till administreringen, se referens Gilead. Upplösningen tar ett antal minuter.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Biktarvy (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen, fukt känsligt. Till slut burken väl. Om burkens försegling är trasig eller saknas vid första uttag ska innehållet inte användas. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordinerars i samråd med infektionsspecialist.

HIV-infektion

Barn från 2 år, 14 - 24 kg: 30/120/15 mg x 1

Barn från 25 kg: 50/200/25 mg x 1

ÖVRIG INFORMATION

Biktarvy metaboliseras via CYP3A och UGT1A1.

Samtidig administrering av potenta inducerare av dessa enzymer är kontraindicerad.

Samtidig administrering av potenta hämmare av dessa enzymer kan öka plasmakoncentrationen av Biktarvy signifikant.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines

<https://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/>

Internetadress Gilead - Biktarvy, crushing or splitting of tablets

<https://www.askgileadmedical.com/docs/biktarvy/biktarvy-crushing-or-splitting-of-tablets>

Internetadress RAV, Referensgruppen för antiviral terapi - Antiretroviral behandling av HIV-infektion

<http://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5199

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-05-22

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT