



Duloxetin oralt

(ex Cymbalta) kapslar

Ökad suicidrisk i det tidiga skedet av behandlingen.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Enterokapslar 20, 30, 40 och 60 mg (ex Cymbalta)

ADMINISTRERING

Oralt: Kapseln kan öppnas och innehållet blandas i en sur vätska för omedelbar administrering. Ska inte krossas.

Enteralt: Ska inte administreras i sond pga hög risk för stopp.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Duloxetin (från registrerad produkt)

Enterokapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Vissa fabrikat anger att produkten är fuktkänslig och ska förvaras i originalförpackningen. Se produktresumé. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Generaliserat ångestsyndrom (ej förstahandsval)

Barn från 7 år:

Startdos: 30 mg x 1 i 2 veckor

Dosen kan sedan ökas till 60 mg x 1.

Vissa patienter kan dock ha behov av högre dos. Dosen kan i sådana fall ökas med 30 mg/dygn till maximalt 120 mg x 1.

Depression, vid utebliven effekt vid behandling med två SSRI-preparat

Barn från 7 år:

Startdos: 30 mg x 1 i 1 - 2 veckor

Dosen kan sedan ökas till 60 mg x 1.

Måldos: 60 (- 90) mg x 1. Vissa patienter kan dock ha behov av högre dos. Dosen kan i sådana fall ökas med 30 mg/dygn till maximalt 120 mg x 1.

ÖVRIG INFORMATION

Samtidig administrering av duloxetin och serotonerga preparat som SSRI, SNRI samt TCA kan ge ökad risk för serotonergt syndrom. Överväg extra monitorering av tecken på serotonerga biverkningar vid samtidig behandling.

Duloxetin bör inte användas i kombination med läkemedel som är starka hämmare av CYP1A2, t.ex. ciprofloxacin, då det leder till ökad plasmakoncentration av duloxetin.

Utsättning av duloxetin ska ske successivt. Planera utsättningen för att undvika eventuella återfall. Risk finns för övergående utsättningssymtom med yrsel, influensaliknande symtom och skakningar.

Duloxetine oralt

(ex Cymbalta) kapslar



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Farmakainstruktion 2024

https://www.bup.se/49e164/contentassets/c5b865fe86d44fbd957c9d71eaaeadbe/farmakainstruktion-bup-stockholm_.pdf

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

<https://lv.se/depression-angest>

Micromedex

PubMed PMID Emslie GJ et al, Acute and longer-term safety results from a pooled analysis of duloxetine studies for the treatment of children and adolescents with major depressive disorder

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25978741>

PubMed PMID Hetrick SE et al, New generation antidepressants for depression in children and adolescents: a network meta-analysis

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34029378>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 5214

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-09-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT