



Bupropion oralt

(ex Voxra) tabletter med modifierad frisättning/depottablett

Risk för krampanfall, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter med modifierad frisättning 150 och 300 mg (ex Voxra)
Depottablett 150 mg (Zyban)

ADMINISTRERING

Oralt: Bupropion bör intas på morgonen, då sömnsvårigheter är en mycket vanlig biverkning.

Tabletterna ska sväljas hela. Tabletterna ska inte delas, krossas eller tuggas eftersom det kan leda till ökad risk för biverkningar, inklusive krampanfall.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Bupropion (registrerad produkt)

Tablett med modifierad frisättning

Förvaras vid högst 25 °C. Vissa tillverkare anger att preparatet är fukt känsligt samt ljuskänsligt och ska förvaras i originalförpackningen, se produktresumé. Gäller båda styrkorna.

Depottablett

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Tilläggsbehandling vid depression som inte svarat på enbart SSRI

Barn från 16 år:

Startdos: 150 mg x 1 på morgonen

Om ingen förbättring observeras efter 4 veckors behandling kan dosen ökas till 300 mg x 1 på morgonen.

Kontrollerade studier på barn och ungdomar saknas, rekommendationen bygger på erfarenhet från vuxna.

ÖVRIG INFORMATION

Det finns en dosberoende risk för krampanfall vid behandling med bupropion, därför ska den rekommenderade dosen inte överskridas.

Bupropion kan höja plasmanivån av fluoxetin, därför kan dosen av fluoxetin behöva reduceras vid tillägg av bupropion.

Samtidig administrering av bupropion och serotonerga preparat som SSRI, SNRI samt TCA kan leda till serotonergt syndrom. Om samtidig behandling är kliniskt motiverad rekommenderas noggrann observation av patienten, speciellt vid nyinsättning samt vid doshöjningar. MAO-hämmare i kombination med bupropion är kontraindicerat.

Då bupropion kan ge förhöjt blodtryck ska detta följas.

Överkänslighet mot bupropion kan yttra sig som influensaliknande symtom eller ge utslag.





Bupropion oralt

(ex Voxra) tabletter med modifierad frisättning/depottablett

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Farmakainstruktion 2023 - Kunskapsstöd för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling inom BUP Stockholm

<https://www.bup.se/494342/contentassets/c5b865fe86d44fbd957c9d71eaaeadbe/farmakainstruktion-bup-stockholm.pdf>

Internetadress Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri - riktlinjer

<https://slf.se/sfbup/riktlinjer/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

<https://lv.se/depression-angest>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 5215

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-01-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT