



Kvetiapin oralt

(ex Quetiapine Accord, Seroquel Depot) tabletter/depottabletter

Ökad suicidrisk i det tidiga skedet av behandlingen.

Risk för extrapyramidala symtom, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 25, 100, 200 och 300 mg (ex Quetiapine Accord)
Depottabletter 50, 150, 200, 300 och 400 mg (ex Seroquel Depot)

ADMINISTRERING

Kvetiapin har sederande effekt och tas med fördel till kvällen.

Oralt: Snabbfrisättande tabletter kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering, den aktiva substansen smakar dock illa.

Depottabletter ska sväljas hela och får inte delas eller krossas.

Entertalt: Snabbfrisättande tabletter kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering. Vid ofullständig krossning kan bitar av tablettens dragering orsaka stopp i tunn sond.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Kvetiapin (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor.

Depottablett

Förvaras i rumstemperatur. Vissa fabrikat anger att produkten är fukt känslig och ska förvaras i originalförpackningen. Se produktresumé. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Akut maniska episoder vid bipolär sjukdom

Barn 12 - 18 år:

	Tablett (snabb frisättning)	Depottablett (långsam frisättning)
Dag 1:	25 mg x 2	50 mg x 1
Dag 2:	50 mg x 2	100 mg x 1
Dag 3:	100 mg x 2	200 mg x 1
Dag 4:	150 mg x 2	300 mg x 1
Dag 5:	200 mg x 2	400 mg x 1

Dosen utvärderas och justeras beroende på kliniskt svar 1 - 2 veckor efter uppnådd måldos på 400 - 600 mg/dygn. Max: 800 mg/dygn.

Bipolär sjukdom med depression

Barn 12 - 18 år:

	Tablett (snabb frisättning)	Depottablett (långsam frisättning)
Dag 1:	25 mg x 2	50 mg x 1
Dag 2:	50 mg x 2	100 mg x 1
Dag 3:	100 mg x 2	200 mg x 1
Dag 4:	150 mg x 2	300 mg x 1

Dosen utvärderas och justeras beroende på kliniskt svar 1 - 2 veckor efter uppnådd måldos på 300 mg/dygn.

Emotionellt instabil personlighetsstörning (EIP) (låg evidens)

Barn 12 - 18 år:

	Depottablett (långsam frisättning)
Dag 1:	50 mg x 1
Dag 2:	100 mg x 1
Dag 3:	150 mg x 1

Depottabletter ger en jämnare nivå, vilket eventuellt har klinisk betydelse vid EIP. Doser över 150 mg till vuxna har inte visat någon ytterligare effekt.



Kvetiapin oralt

(ex Quetiapine Accord, Seroquel Depot) tabletter/depottabletter

ÖVRIG INFORMATION

Vid behandling med kvetiapin har lägre nivåer av sköldkörtelhormon visats hos barn. Kontrollera därför tyreoidestimulerande hormon (TSH) före insättning av kvetiapin och därefter halvårsvis.

Kvetiapin är kontraindicerat vid samtidig behandling med läkemedel som hämmar CYP3A4, t. ex. ketokonazol.

Risk för extrapyramidala symtom vid behandling med kvetiapin t.ex. dyskinesi (ökad muskelrörlighet), dystoni (muskelkramper) och parkinsonism.

Antidot vid extrapyramidala symtom: biperiden

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Farmakainstruktion 2024

https://www.bup.se/49e164/contentassets/c5b865fe86d44bd957c9d71eaaeadbe/farmakainstruktion-bup-stockholm_.pdf

Internetadress Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri - riktlinjer

<https://sif.se/sfbup/riktlinjer/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neuroleptika vid vissa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar

<https://lv.se/neuroleptikatillbarn>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 5217

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-09-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT