



Beklometason inhalation

(ex Aerobec, Beclomet Easyhaler)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Inhalationsspray 50, 100 mikrog/dos (Aerobec, Aerobec Autohaler)

Inhalationspulver 200 mikrog/dos (Beclomet Easyhaler)

ADMINISTRERING

Inhalation:

Patienten bör skölja munnen med vatten efter varje administrering.

Till yngre barn rekommenderas att inhalationssprayen (ej Autohaler) används tillsammans med en andningsbehållare (spacer). Håll masken tätt över mun och näsa, så snart barnet klarar det bör munstycke användas då det ger bättre utbyte (från ca 3 års ålder).

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Aerobec (registrerad produkt)

Inhalationsspray, lösning

Förvaras vid högst 30 °C. Skyddas mot direkt solljus och värme. Gäller även

Aerobec Autohaler, båda styrkorna.

Beclomet Easyhaler (registrerad produkt)

Inhalationspulver

Förvaras vid högst 25 °C. Bruten förpackning, efter att aluminiumfolien öppnats, är fuktkänslig och hållbar 6 månader.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Infektionsutlöst astma (periodisk behandling)

Barn 1 mån - 5 år:

Dag 1 - 3: 100 mikrog x 4

Dag 4 - 10: 100 mikrog x 2

Om symtomen försvunnit inom 1 - 2 dygn kan behandlingen avbrytas.

Vid svåra episoder eller förekomst av obstruktiva besvär oftare än en gång per månad bör kontinuerlig lågdosbehandling ges.

Underhållsbehandling av astma

Inhalationsspray (Aerobec/Aerobec Autohaler)

Barn 1 mån - 11 år:

Låg dos: 50 mikrog x 1 - 2

Medelhög dos: 50 - 100 mikrog x 2

Hög dos: 100 - 200 mikrog x 2

Barn 12 - 18 år:

Låg dos: 50 - 100 mikrog x 2

Medelhög dos: 100 - 200 mikrog x 2

Hög dos: 200 - 400 mikrog x 2, max 800 mikrog/DYGN

Vilken dos som används styrs av patientens symtom, se behandlingstrappa i Läkemiddelsverkets behandlingsrekommendation Astma hos barn och vuxna (finns som klickbar referens).

Inhalationspulver (Beclomet Easyhaler)

Barn 5 - 7 år: 200 mikrog x 1 - 2

Barn 8 - 11 år: 200 - 400 mikrog x 1 - 2

Barn 12 - 18 år: 200 - 800 mikrog x 2





Beklometason inhalation

(ex Aerobec, Beclomet Easyhaler)

ÖVRIG INFORMATION

Många av doserna ovan är högre än de som är godkända i produktresumén, därför kan det vara bra att ange "Obs" på receptet.

Alla barn som har underhållsbehandling med inhalationssteroid bör längdmätas 1 - 2 ggr per år. Låg till medelhög dos påverkar vanligen inte tillväxten.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Astma hos barn och vuxna
www.lakemedelsverket.se/astma

PubMed PMID Cochane Library Syst Rev 2019 Axelsson I et al: Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects of different drugs and delivery devices on growth
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31194879>

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5221

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-11-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT