



Tezakaftor + Ivakaftor oralt

(Symkevi) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 50 mg tezakaftor + 75 mg ivakaftor
Tablett 100 mg tezakaftor + 150 mg ivakaftor

ADMINISTRERING

Oralt:
Tabletterna ska sväljas hela, får inte tuggas, krossas eller delas. Ska tas tillsammans med mat som innehåller fett.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Symkevi (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordineras av specialistläkare väl insatt i behandling av cystisk fibros.

Cystisk fibros, kombinationsbehandling med Kalydeco vid dubbel F508del-mutation eller F508del-mutation i kombination med residualfunktionsmutation

Doserna tas med så nära 12 timmars mellanrum som möjligt.

Dosen Symkevi tas på morgonen tillsammans med mat som innehåller fett.

Barn 6 - 11 år, under 30 kg: 50 + 75 mg x 1

Barn 6 - 11 år, från 30 kg: 100 + 150 mg x 1

Barn 12 - 18 år: 100 + 150 mg x 1

Ges i kombination med ivakaftor (Kalydeco) som tas på kvällen, se annan instruktion.

ÖVRIG INFORMATION

Vid samtidig behandling med läkemedel som är måttliga eller starka CYP3A-hämmare (inkl. johannesört) ska dosen Symkevi sänkas, se produktresumé. Mat och dryck innehållande grapefrukt ska undvikas.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Paterson S L et al. Tezacaftor and ivacaftor for the treatment of cystic fibrosis

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31626570>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5223

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-01-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT