



Ivakaftor + Tezakaftor oralt (Symkevi) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 50 + 75 mg och 100 + 150 mg

ADMINISTRERING

Oralt:

Tabletterna ska sväljas hela, får inte tuggas, krossas eller delas. Ska tas tillsammans med mat som innehåller fett.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Symkevi (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordineras av cystisk fibros-läkare.

Cystisk fibros, kombinationsbehandling vid dubbel F508del-mutation eller F508del-mutation i kombination med residualfunktionsmutation

Ges i kombination med ivakaftor (Kalydeco) som tas på kvällen, se annan instruktion. Doserna tas med så nära 12 timmars mellanrum som möjligt.

Dosen Symkevi tas på morgonen tillsammans med mat som innehåller fett.

Barn 6 - 11 år, under 30 kg: 50 + 75 mg x 1

Barn 6 - 11 år, från 30 kg: 100 + 150 mg x 1

Barn 12 - 18 år: 100 + 150 mg x 1

ÖVRIG INFORMATION

Vid samtidig behandling med läkemedel som är måttliga eller starka CYP3A-hämmare ska dosen Symkevi sänkas, se produktresumé.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Paterson S L et al. Tezacaftor and ivacaftor for the treatment of cystic fibrosis

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31626570>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5223

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-12-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT