



Zanamivir inhalation 5 mg/dos

(Relenza)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Inhalationspulver 5 mg/dos (Relenza)

ADMINISTRERING

Inhalation:

Dosen inhaleras med hjälp av medföljande Diskhaler, som laddas med en dosskiva (Rotadisk). Varje dosskiva innehåller 4 avdelade doser (4 x 5 mg). Vid varje dostillfälle ska 2 x 5 mg inhaleras.

Diskhaler ska hållas i ett horisontellt läge. I direkt anslutning till inhalationen, lyft upp locket på Diskhaler så långt det går så att blistret perforeras, stäng sedan locket igen. Innan inhalationen görs en normal utandning. Obs - utandningen ska INTE göras genom Diskhaler (pulvret blåser bort). Efter utandningen placeras Diskhaler mellan tänderna, läpparna sluts och ett snabbt, djupt andetag tas. Därefter hålls andan i några sekunder.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Zanamivir (registrerad produkt)

5 mg/dos, Inhalationspulver, avdelad dos

Förvaras vid högst 30 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Observera att behandling med zanamivir inte är en ersättning för influensavaccination.

Behandling ska påbörjas så snart som möjligt och inom 36 timmar efter symptomdebut (vid behandling) respektive efter exponering för infekterad person (vid profylax).

Behandling av influensa

Barn 5 - 18 år: 10 mg x 2

Behandlingstid: 5 dagar

Profylax mot influensa efter exponering

Barn 5 - 18 år: 10 mg x 1

Behandlingstid: 10 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Zanamivir inhalationspulver är kontraindicerat för patienter med mjölkproteinallergi.

Andra inhalationsläkemedel, så som läkemedel mot astma, ska tas före inhalation av zanamivir.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling och profylax vid influensa

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer?q=influensa>

PubMed PMID J-W Liu et al. Comparison of antiviral agents for seasonal influenza outcomes in healthy adults and children.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34387680>



Zanamivir inhalation 5 mg/dos (Relenza)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5226

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-01-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT