



Baloxavir oralt

(Xofluza) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Filmdragerad tablett 40 och 80 mg (Xofluxa)

ADMINISTRERING

Ska inte tas samtidigt med läkemedel eller kosttillskott som innehåller järn, zink, selen, kalcium och/eller magnesium. Samtidig administrering kan sänka plasmakoncentrationen av baloxavir.

Oralt

Enteralt:

Information om enteral administrering saknas. Det finns beskrivet att tabletter har slammats upp i minst 20 mL vatten. Uppslamningen har tagit ca 35 min.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Baloxavir (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackning, fukt känsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Observera att behandling med baloxavir inte är en ersättning för influensavaccination.

Behandling ska ges så snart som möjligt och inom 48 timmar efter symtomdebut (vid behandling) respektive efter exponering för infekterad person (vid profylax).

Profylax och behandling av influensa

Behandling avser endast okomplicerad influensa.

Barn 20 -79 kg: engångsdos 40 mg

Barn från 80 kg: engångsdos 80 mg

ÖVRIG INFORMATION

I tabletterna föreligger baloxavir som baloxavirmarboxil, vilket är en prodrug till baloxavir. Både tabletternas styrka och doseringen är uttryckta i baloxavirmarboxil.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling och profylax vid influensa

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer?q=influensa>

PubMed PMID J-W Liu et al. Comparison of antiviral agents for seasonal influenza outcomes in healthy adults and children.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34387680>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5227

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-04-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT