



PARENTERAL NUTRITION: SmofKabiven Perifer intravenös inf

standardkomposition

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

SmofKabiven Perifer: 70 kcal och 3,2 gram aminosyror per 100 mL

Ska ges med lipider, dvs alla kamrar ska aktiveras.

Spårämnen och/eller vitaminer tillsätts vanligen, dessa ordinareras separat.

Denna lösning är lämplig för barn från 2 år.

Beredningsinstruktion:

1. Kontrollera att påsen är oskadd och ta bort ytterpåsen och syreabsorbatorn.
2. Aktivera påsen genom att rulla den från handtagssidan mot portarna så att de vertikala förslutningarna mellan kamrarna bryts. Den horisontella svetsen behöver inte öppnas utan är till för att stabilisera påsen.
3. Vänd påsen minst 3 gånger för att blanda innehållet ordentligt.
4. Tillsätt ordinerade tillsatser via den vita tillsatsporten och blanda igen.
5. Koppla infusionsaggregatet till den blå infusionsporten.

ADMINISTRERING

Intravenös infusion (kontinuerlig): perifer eller central infart

Bör ges under så stor del av dygnet som möjligt. Rekommenderad infusionstid är 20 tim. Fullmängd parenteral nutrition (TPN) bör inte ges på kortare tid än 16 tim/dygn.

Vid samadministrering med andra läkemedel bör blandbarheten kontrolleras noga då parenterala nutritionslösningar är komplext sammansatta och risk för blandbarhetsproblem finns. Följ lokal riktlinje.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

SmofKabiven Perifer (registrerad produkt)

Infusionsvätska, emulsion

Oöppnad påse förvaras vid högst 25 °C i ytterpåsen. Får ej frysas. Efter iordningställande: 24 tim i rumstemperatur eller kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Om dygnsvätskebehovet inte täcks av nutrition (inkl. SmofKabiven Perifer) och läkemedel, ordinareras extra vätsketillförsel parallellt, enteralt eller parenteralt.

SmofKabiven Perifer ska ges med lipider, dvs alla kamrar ska aktiveras.

Behov av parenteral nutrition

Barn från 2 år: Ordinaras enligt lokal riktlinje för parenteral nutrition.

Insättning av parenteral nutrition sker via uppträppning.

Ordinerad mängd bör ges under så stor del av dygnet som möjligt. Rekommenderad infusionstid är 20 tim. Fullmängd parenteral nutrition (TPN) bör inte ges på kortare tid än 16 tim/dygn.

Maximal infusionshastighet

Barn 2 - 18 år: 3 mL/kg/TIM, max 40 mL/kg/DYGN

Vitaminer, spårämnen samt eventuella andra tillsatser ordinareras separat.





Parenteral nutrition: SmofKabiven Perifer intravenös inf

standardkomposition

ÖVRIG INFORMATION

För information om möjliga tillsatser, se lokala riktlinjer, produktresumé och/eller kontakta företaget. Vid tillsats av elektrolyter beakta följande:

- Fosfat ska tillsättas i form av organiskt fosfat (Glycophos), vilket ger tillskott av både fosfat och natrium.
- Kalium ska tillsättas i form av kaliumklorid (Addens/Addex-Kaliumklorid).
- Organiskt fosfat och kalium (Addex-Kalium) samt oorganiskt kalcium (kalciumklorid) ska inte användas då de orsakar utfällningar.
- Mängden natrium respektive kalium kan ersättas av varandra vid behov. Detta gäller inte övriga elektrolyter.

Förpackningsstorlekar:

1206 mL, 800 kcal/påse

1448 mL, 1000 kcal/påse

1904 mL, 1300 kcal/påse

Innehåll i SmofKabiven Perifer per 100 mL:

Totalt kalori (kcal)	70
Aminosyror (g)	3,2
Kväve (g)	0,51
Glukos (g)	7,1
Lipider (g)	2,8
Natrium (mmol)	2,5
Kalium (mmol)	1,9
Magnesium (mmol)	0,32
Kalcium (mmol)	0,16
Fosfat (mmol)	0,82
Acetat (mmol)	6,6
Sulfat (mmol)	0,32
Klorid (mmol)	2,2
Osmol (mosm/L)	ca 850
pH	ca 5,6





Parentral nutrition: SmofKabiven Perifer intravenös inf

standardkomposition

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ESPGHAN guidelines: Paediatric Parenteral Nutrition

<https://espghan.info/published-guidelines/index.php>

Internetadress Internetmedicin - Parenteral nutrition (PN) hos barn och ungdomar

<https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/pediatrik/parenteral-nutrition-pn-hos-barn-och-ungdomar/>

Internetadress VGR, Alfresco - Parenteral nutrition för barn och ungdomar på Drottning Silvias barnsjukhus - dosering och ordination

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SU9774-1570060579-556/SURROGATE/Parenteral%20nutrition%20f%C3%B6r%20barn%20och%20ungdomar%20p%C3%A5%20Drottning%20Silvias%20barnsjukhus%20-%20dosering%20>

Rekommendation , (Grade 1A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunit.org/eped_extra/lokalreferens.html#5235

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5235

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-02-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT