



Omeprazol oralt 2 mg/mL

(Pedippi) oral suspension

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Färdigspädd oral suspension 2 mg/mL

Alt. 2: Pulver till oral suspension 2 mg/mL, späds på vårdenhet

INGEN SPÄDNING

Alt. 1

ORAL SUSP
2 mg/mL
75 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Omeprazol		Vatten*		ORAL SUSP
2 mg/mL				2 mg/mL
1 st	+	64 mL	=	75 mL

Beredningsinstruktion:

*Sterilt vatten kan vara lämpligt för infektiösa barn, till övriga patienter går kranvatten bra.

Utförlig beredningsinstruktion finns på kartongen och i bipacksedel.

Förpackningen innehåller pulver både i röda kapsylen och i flaskan. De båda pulvren behöver blandas innan vatten tillsätts. En röd blandningsskiva kommer att landa i pulvret, denna ska vara kvar i flaskan för att hjälpa till att blanda pulvret och sedan suspensionen.

Granulatet bidrar med volym, därför blir slutvolymen större än den tillsatta volymen vatten.

Den färdiga suspensionen är vit-brunaktig och kan innehålla mörka prickar.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Dokumenterad erosiv esofagit

Nyfödda: 0,5 mg/kg x 1

Barn 1 - 11 mån: 0,5 mg/kg x 1

Barn 1 - 11 år, under 20 kg: 10 mg x 1

Barn 1 - 11 år, från 20 kg: 10 - 20 mg x 1

Barn 12 - 18 år: 20 - 40 mg x 1

Symtomatisk behandling av gastroesofagal refluxsjukdom (GERD)

Barn 6 - 11 år: 10 mg x 1

Barn 12 - 18 år: 20 mg x 1

Vanlig behandlingstid: 2 - 4 veckor.

Eosinofil esofagit

Initial behandling: 1 - 2 mg/kg/DYGN, max 80 mg/DYGN

Helst bör dygnsdosen fördelas på 2 dosstillfällen.

Behandlingseffekten bör kontrolleras med gastroskopi efter 2 - 3 månaders behandling.

Om patienten svarar på behandling med protonpumpshämmare är det aktuellt med underhållsbehandling. Lägsta effektiva dos ska då eftersträvas.





Omeprazol oralt 2 mg/mL

(Pedippi) oral suspension

ADMINISTRERING

Flaskan måste skakas 20 sekunder innan varje dos mäts upp.

Samtidigt intag av föda minskar och fördröjer absorptionen av omeprazol, men effekten blir densamma som vid administrering utan föda.

Oralt

Enteralt: kan ges i sond från 6 Fr

RIMLIG DOS för Omeprazol oralt 2 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	0,25 mL	1,25 mL	2,5 mL	-
1 mg/kg	-	2,5 mL	5 mL	25 mL
10 mg	-	-	5 mL	-
20 mg	-	-	-	10 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Omeprazol (registrerad produkt)

2 mg/mL, Pulver till oral suspension

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Fuktkänsligt.

2 mg/mL, Oral suspension

Förvaras i kylskåp. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Kan förvaras i rumstemperatur (högst 25 °C) upp till 2 dagar. Ljuskänsligt.

REFERENS/LÄNK

Internetadress FDA - Office of Clinical Pharmacology Review Esomeprazole

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pediatric/21689_Esomeprazole_Clinpharm_Prea.pdf

Läkemedelsverket Läkemedelsfakta, Pedippi 2 mg/ml pulver till oral suspension

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=20220124000012>

PubMed PMID Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN) and the European Society (ESPGHAN) 2019

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29470322>

PubMed PMID Tighe et al. Pharmacological treatment of children with gastro-oesophageal reflux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25419906>

Rekommendation , (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - GERD

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Helicobacter pylori hos barn

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska föreningen för pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition, Vårdprogram för Eosinofil esofagit hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5252

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-06-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT