



## Natriumpikosulfat + Magnesiumcitrat oralt

(Picoprep) pulver till oral lösning

### ADMINISTRERING

Dospulvret ska blandas med kallt vatten innan intag (ca 150 mL till en dospåse och ca 50 mL till en dossked). Rör om i 2 - 3 minuter.

Ibland blir lösningen varm när pulvret löses upp, låt då lösningen svalna innan administrering.

Viktigt med rikligt vätskeintag med klar dryck (inte bara vatten) under behandling med Picoprep. Klar dryck kan t ex vara juice utan fruktkött, läsk, buljong, te, kaffe (utan mjölk).

Oralt: Lösningen smakar bättre om den administreras kylskåpskall.

Enteralt: Se till att pulvret är helt upplöst innan administrering.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Picoprep (registrerad produkt)

Pulver till oral lösning, dospåse

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Överbliven lösning eller pulver ska inte sparas.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doserna nedan avser struket dosmått med den i förpackningen medföljande dosskeden. 1 dossked = 1/4 dospåse = 4 gram pulver.

Viktigt med rikligt vätskeintag under behandlingen, se lokal rutin. Vätskan ska inte bara bestå av vatten, se Administrering.

#### Tarmtömning inför röntgenundersökning eller endoskopi

Dos 1: 10 - 18 timmar innan undersökning eller operation

Dos 2: 4 - 6 timmar innan undersökning eller operation

Om dos 2 inte kan ges 4 - 6 timmar innan undersökning eller operation, ges den kvällen före undersökningen, minst 2 timmar innan sänggående.

	Dos 1	Dos 2
Barn 12 - 23 mån:	1 dossked	1 dossked
Barn 2 - 3 år:	2 dosskedar	2 dosskedar
Barn 4 - 8 år:	1 dosPÅSE	2 dosskedar
Barn 9 - 18 år:	1 dosPÅSE	1 dosPÅSE

#### Tarmtömmande endagsbehandling inför uppstart av makrogol-behandling vid svår förstoppning (lokal tradition Skåne, låg evidens)

Ges som två doser dagen före start av behandling med makrogol.

Förslag till tidsintervall:

Dos 1: på morgonen

Dos 2: ca 6 timmar efter dos 1

	Dos 1	Dos 2
Barn 12 - 23 mån:	1 dossked	1 dossked
Barn 2 - 3 år:	2 dosskedar	2 dosskedar
Barn 4 - 8 år:	1 dosPÅSE	2 dosskedar
Barn 9 - 18 år:	1 dosPÅSE	1 dosPÅSE





## Natriumpikosulfat + Magnesiumcitrat oralt

(Picoprep) pulver till oral lösning

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

**Svår förstoppning t.ex. då natriumpikosulfat orala droppar är restnoterade (ej förstahandsval)**

Barn 2 - 5 år: 1 dossked x 1

Barn 6 - 11 år: 1 - 2 dosskedar x 1

Barn 12 - 18 år: 0,5 - 1 dosPÅSE x 1

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Joo et al: Alterations in colonic anatomy induced by chronic stimulant laxatives: the cathartic colon revisited. J Clin Gastroenterol. 1998

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9649012>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Vårdprogram Förslag till handläggning när natriumpikosulfat är restnoterat

<https://gastro.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/10/2022/12/Forslag-nar-Cilaxoral-ar-restnoterat.pdf>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5258

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-05-22

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**