



# Silibinin intravenös inf 2 mg/mL

(Legalon SIL licens)

Behandling sker ALLTID i samråd med Giftinformationscentralen, tel: 010-456 67 19

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Infusionslösning 2 mg/mL (Legalon SIL, licens)

## EN-STEGSSPÄDNING

Legalon SIL		NaCl 9 mg/mL alt		INF
350 mg	+	Glukos 50 mg/mL	=	<b>2 mg/mL</b>
1 st		175 mL		175 mL

### Beredningsinstruktion:

Den iordningställda lösningen är ljusgul och klar.  
Kort hållbarhet, se Hållbarhet och förvaring.

## ADMINISTRERING

Intravenös infusion: Ges på 1 timme.

Intravenös infusion (kontinuerlig)

## RIMLIG DOS för Silibinin intravenös inf 2 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	-	-	25 mL	125 mL
20 mg/kg/DYGN	-	-	0,07 mL/min	0,35 mL/min

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Legalon SIL (licensprodukt)

350 mg, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

Förvaras vid högst 25 °C.

2 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

6 timmar vid 30 °C alternativt 24 timmar i kylskåp. Tiden är satt utifrån kemisk/fysikalisk stabilitet. Se även Övrig information.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Amatoxinförgiftning (vit flugsvamp, lömsk flugsvamp, gifthätting)

Behandling sker ALLTID i samråd med Giftinformationscentralen (GIC),  
tel: 010-456 67 19.

Barn och vuxna: 5 mg/kg ges som infusion på 1 timme.  
Därefter startas en kontinuerlig infusion motsvarande 20 mg/kg/DYGN.

Behandlingen ges tills 3 dygn efter förtäringen av svampen.

GIC ska alltid kontaktas för diskussion innan behandlingen avslutas.

## ÖVRIG INFORMATION

I en äldre produktresumé anges hållbarhetstiden för den iordningställda lösningen till 12 timmar vid 20 °C. Rumstemperaturen på sjukhus är ofta högre än 20 °C och därför rekommenderas inte 12 timmars hängtid.

## REFERENS/LÄNK

Internetadress Giftinformationscentralen - Amatoxinhaltiga svampar

<https://giftinformation.se/lakare/substanser/amatoxinhaltiga-svampar/>

PubMed PMID Horowitz BZ. Silibinin: a toxicologist's herbal medicine? Clin Toxicol (Phila). 2022 Nov;60(11):1194-1197.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36222816>

PubMed PMID Tan JL, Stam J, van den Berg AP, van Rheenen PF, Dekkers BGJ, Touw DJ. Amanitin intoxication: effects of therapies on clinical outcomes - a review of 40 years of reported cases. Clin Toxicol (Phila). 2022 Nov;60(11):1251-1265.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36129244>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Summary of Product Characteristics (SPC) Legalon SIL

[https://vardgivare.regionostergotland.se/download/18.725e1934187bb9dc58022c3/1683115496473/Legalon%20sil,%20Meda%20GmbH%20\(Tyskland\)%20-07-2015.pdf](https://vardgivare.regionostergotland.se/download/18.725e1934187bb9dc58022c3/1683115496473/Legalon%20sil,%20Meda%20GmbH%20(Tyskland)%20-07-2015.pdf)

UpToDate

<http://www.uptodate.com>



## Silibinin intravenös inf 2 mg/mL

(Legalon SIL licens)



### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 5268

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-09-19

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**