



Ropivakain + Klonidin inf/inj 2 mg/mL + 1 mikrog/mL

(ex Ropivacain Fresenius Kabi + ex Catapressan) flera administreringsätt

Får INTE ges intravenöst (intravasalt).

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Ropivakain + Klonidin 2 mg/mL + 1 mikrog/mL
(ex Ropivacain Fresenius Kabi + ex Catapressan)

Ropivakain kan även ges utan tillsats av klonidin, se annan instruktion.

Tillsatser som ger Ropivakain + Klonidin inf/inj 2 mg/mL + 1 mikrog/mL

Alt. 1: 30 mL

Ropivakain 2 mg/mL	30 mL
Klonidin 150 mikrog/mL	0,2 mL

Tillsatser som ger Ropivakain + Klonidin inf/inj 2 mg/mL + 1 mikrog/mL

Alt. 2: 100 mL

Ropivakain 2 mg/mL	100 mL
Klonidin 150 mikrog/mL	0,7 mL

Tillsatser som ger Ropivakain + Klonidin inf/inj 2 mg/mL + 1 mikrog/mL

Alt. 3: 200 mL

Ropivakain 2 mg/mL	200 mL
Klonidin 150 mikrog/mL	1,4 mL

ADMINISTRERING

Epiduralt (inkl sakralt): engångsdos eller infusion/upprepade doser via en EDA

Perifer nervblockad: engångsdos eller upprepade doser/infusion via blockadkateter

Lokalinfiltration: engångsdos eller upprepade doser/infusion via sårkateter

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska endast ordineras av läkare med god kännedom om komplikationsrisker, övervakning och säkerhetsåtgärder.

Dosen är beroende av vilken nerv eller vilket område som ska bedövas. Följ lokal rutin för rekommenderad dos.

Nedan anges endast MAXDOSER utifrån risk för systemisk toxicitet.

Intra- och postoperativ smärtlindring

MAXDOS ropivakain engångsdos:

Nyfödda : 2 mg/kg	(1 mL/kg)
Barn 1 - 11 mån: 2 mg/kg	(1 mL/kg)
Barn 1 - 18 år: 3 mg/kg	(1,5 mL/kg)

MAXDOS ropivakain infusion/upprepade doser:

Nyfödda : 0,3 mg/kg/tim	(0,15 mL/kg/tim)
Barn 1 - 11 mån: 0,3 mg/kg/tim	(0,15 mL/kg/tim)
Barn 1 - 18 år: 0,5 mg/kg/tim	(0,25 mL/kg/tim)

Dock max 300 mg ropivakain inom 4 timmar. Maximal DYGNSDOS 800 mg.

Vid dos 0,3 mg/kg/timme av ropivakain får patienten 3,6 MIKROG/kg/DYGN av klonidin.

ÖVRIG INFORMATION

Ropivakain har (liksom levobupivakain) längre effektduration och något längre anslagstid än många andra lokalanestesimedel. Vid behov av mer snabbverkande/kortverkande lokalanestesimedel är lidokain att föredra.





Ropivakain + Klonidin inf/inj 2 mg/mL + 1 mikrog/mL (ex Ropivacain Fresenius Kabi + ex Catapressan) flera administrerings sätt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klonidin (från registrerad produkt)

150 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Bruten ampull får ej sparas, används direkt.

Ropivakain (registrerad produkt)

2 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Bruten ampull får ej sparas.

Ropivakain+Klonidin (från registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

Efter iordningställande: Hållbar 12 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp.

Lokalt arbetssätt kan medge längre hållbarhetstid, följ lokal rutin.

REFERENS/LÄNK

Bok Coté. CJ A Practise of Anesthesia for Infants and Children, 6th edition 2019. Elsevier

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5294

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 5294

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-09-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT