



Ropivakain inj 5 mg/mL

(ex Ropivacain Fresenius Kabi) nervblockad

Får INTE ges intravenöst (intravasalt).

INGEN SPÄDNING

INJ LÖ
5 mg/mL
10 mL

ADMINISTRERING

Central eller perifer nervblockad: engångsdos

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ropivakain (registrerad produkt)

5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Efter iordningställande: 12 timmar rumstemp, 24 timmar kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Denna koncentration används primärt för kirurgisk anestesi av anestesilog.

Ska endast ordineras av läkare med god kännedom om komplikationsrisker, övervakning och säkerhetsåtgärder.

Dosen är beroende av vilken nerv eller vilket område som ska bedövas. Följ lokal rutin för vanlig dos.

Nedan anges endast MAXDOSER utifrån risk för systemisk toxicitet.

Intraoperativ smärtlindring i samband med kirurgiska ingrepp

MAXDOS engångsdos:

Barn 1 – 18 år: 3 mg/kg (0,6 mL/kg)

Dock max 300 mg inom 4 timmar. Maximal DYGNSDOS 800 mg.

ÖVRIG INFORMATION

Ropivakain har (liksom levobupivakain) längre effektduration och något längre anslagstid än många andra lokalanestesimedel. Vid behov av mer snabbverkande/kortverkande lokalanestesimedel är lidokain att föredra.

REFERENS/LÄNK

Bok Coté. CJ A Practise of Anesthesia for Infants and Children, 6th edition 2019. Elsevier

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5296



Ropivakain inj 5 mg/mL

(ex Ropivacain Fresenius Kabi) nervblockad



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 5296

Versionsnummer, major: 1

Giltig fr o m: 2023-11-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT