



## Budesonid lokalt

(Jorveza) munsönderfallande tablett

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Munsönderfallande tablett 0,5 mg; 1 mg (Jorveza)

### ADMINISTRERING

Lokalt: Tabletten ska placeras på tungspetsen och tryckas mot gommen, där den sakta kommer att falla sönder (tar vanligen 2 min, men kan ta upp till 20 min). Varefter tabletten löses upp sväljes den budesonid innehållande saliven lite i taget.

Tabletten får inte tuggas eller sväljas ouplöst.

Mat, dryck och munhygien ska undvikas 30 minuter efter att dosen har administrerats då läkemedlet ska verka lokalt på esofaguslemhinnan.

Enligt produktresumé får tabletten inte delas, men vid underhållsbehandling kan 0,5 mg tablett delas med vass kniv eller tablettdelare. För ökad dosnoggrannhet bör den andra halvan sparas till nästa dostillfälle, sparas i blisterförpackningen, skyddad från fukt.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Jorveza (registrerad produkt)

Munsönderfallande tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt och ljuskänsligt. Tabletten ska tas ur blistern i samband med intag. Gäller båda styrkorna.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Eosinofil esofagit

Bör ordinerars av eller i samråd med barn gastroenterolog.

Barn ca 8 - 10 år:

Induktionsbehandling, vanligen 8 - 12 veckor: 0,5 mg x 2

Underhållsbehandling: 0,25 mg x 1, ges med fördel på kvällen

Barn 11 - 18 år:

Induktionsbehandling, vanligen 8 - 12 veckor: 1 mg x 2

Underhållsbehandling: 0,25 - 0,5 mg x 1, ges med fördel på kvällen

Mat, dryck och munhygien ska undvikas 30 minuter efter att dosen har administrerats då läkemedlet ska verka lokalt på esofaguslemhinnan.

### ÖVRIG INFORMATION

Jorveza är godkänd för behandling av eosinofil esofagit hos vuxna, men i vårdprogrammet från Barnläkarföreningens gastrosektion har man gjort bedömningen att Jorveza är lämpligt för off-labelanvändning från ca 8 års ålder (när barnet klarar av att hantera tabletten).

Till yngre barn rekommenderas lokal behandling med budesonid suspension för nebulisator, se annan instruktion.

Doserna i denna ePed-instruktion stämmer inte helt överens med de doser som återfinns i det nationella vårdprogrammet för eosinofil esofagit. Detta vårdprogram är under revidering och kommer att uppdateras under våren 2024.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska föreningen för pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition, Vårdprogram för Eosinofil esofagit hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>



## Budesonid lokalt

(Jorveza) munsönderfallande tablett



### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5300

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-02-21

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**