



Mesna oralt

(Uromitexan) tabletter

Anafylaxiberedskap ska finnas.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 400 och 600 mg (Uromitexan)

ADMINISTRERING

Oralt:

Vid beräkning av antal tabletter som ska ges, ska antalet tabletter avrundas nedåt till närmaste hela tabletter.

Vid sväljningssvårigheter kan tabletten krossas och slammas upp i vatten eller blandas med yoghurt eller mjuk kall mat i direkt anslutning till administrering.

Enteralt:

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering i sond.
OBS - vid ofullständig krossning kan bitar av dragering orsaka stopp i tunn sond.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Mesna (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax mot hemorragisk cystit vid cyklofosamid och ifosfamidbehandling, barnonkologi

Barn: Dos beroende på behandlingsprotokoll.

Profylax mot hemorragisk cystit vid behandling med cyklofosamid vid njursjukdom

Första dosen ska ges intravenöst, omedelbart före cyklofosamiddosen, se annan instruktion.

Doserna vid timme 4 och 8 kan ges intravenöst eller oralt. Följ lokal rutin.

Barn: Dos enligt behandlingsprotokoll.

**Profylax mot hemorragisk cystit vid behandling med cyklofosamid vid:
Systemisk lupus erythematosus (med allvarlig organengagemang i CNS eller njurar)
Vaskuliter inklusive CNS-vaskuliter
Lungengagemang vid juvenil dermatomyositis**

Första dosen ska ges intravenöst, omedelbart före cyklofosamiddosen, se annan instruktion.

Doserna vid timme 4 och 8 kan ges intravenöst eller oralt. Följ lokal rutin.

Barn: Dosen för oral mesna ska motsvara 40 % av cyklofosamiddosen.

OBS! Dosen för mesna skiljer sig mellan intravenös och oral behandling. För dosering av intravenöst mesna, se annan instruktion.

ÖVRIG INFORMATION

Överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter administrering av mesna. Hudreaktioner t ex urtikaria, klåda, sveda och angioödem har observerats hos vissa patienter. Det är viktigt att vara medveten om att överkänslighetsreaktionerna kan förvärras vid återexponering och kan i vissa fall vara livshotande. På grund av risken att utveckla anafylaktiska reaktioner ska lämplig akutmedicin finnas tillgänglig.

Mesna oralt

(Uromitexan) tabletter



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

PubMed PMID Dechant K.L. et al. Ifosfamide/mesna. Review of its Antineoplastic Activity, Pharmacokinetic Properties and Therapeutic Efficacy in Cancer .Drugs 42, 428–467 (1991).

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1720382>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5417

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa Akkawi El-Edelbi

ePedID: 5417

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-04-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT