



Innehållet i denna instruktion är endast avsett som utbildningsmaterial för familjer som ingår i det forskningsprojekt som leds av apotekare Ranaa Akkawi El Edelbi vid Barnläkemedelsgruppen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Stockholm 20200604, ePed©

Merkaptopurin tabletter och oral lösning

Merkaptopurin används för att behandla vissa cancertyper genom att stoppa tillväxt och överlevnad av cancerceller.

Om du har frågor eller funderingar var god kontakta din behandlande mottagning.

Råd innan hantering av läkemedlet

- Om du är gravid ska du undvika att komma i kontakt med merkaptopurin.
- Xaluprine oral suspension ska skakas i minst 30 sek vid första användningen. Nästkommande dostillfällen ska flaskan endast skakas i ca 5 sek.
- Med varje flaska Xaluprine oral suspension medföljer en adapter och två orala sprutor. Både adaptern och medföljande sprutor ska kastas och ersättas med en adapter och sprutor från avdelningen.
- Merkaptopurin tas med fördel vid sänggående. För vissa barn behöver läkemedlet tas på morgonen för att undvika lågt blodsocker.
- Merkaptopurin kan tas tillsammans med mat och mjölkprodukter eller på fastande mage. Se till att ge läkemedlet på samma sätt varje dag i förhållande till mat och dryck.
- Låt ditt barn dricka vätska i samband med samt efter intag av läkemedlet.

Biverkningar

Ditt barn kan drabbas av biverkningar under behandling med merkaptopurin. Om nedanstående biverkningar blir värre, inte försvinner/inte blir bättre med tiden samt påverkar ditt barns allmäntillstånd kontakta din behandlande mottagning.

- Illamående
- Tappar hår
- Hudutslag
- Munsår
- Mild huvudvärk

Kontakta läkaren eller sök akutvård

Om ditt barn får svårare biverkningar t.ex. feber, hosta, sveda när ditt barn kissar, blod i urinen, mörk avföring, svårt att andas, ont i bröstet eller andningssvårigheter kontakta din läkare omgående eller sök akutvård.

Övrig viktig information

- Det är viktigt att barnet dricker ofta för att skydda njurarna.
- Berätta alltid för läkare/tandläkare att ditt barn står på merkaptopurin innan behandling/ingrepp.
- Ditt barn ska inte tatuera sig eller skaffa sig piercing (inklusive ta hål i öron) under pågående behandling för att minska blödningsrisken.
- Ditt barn ska inte vaccinera sig med levande vacciner t ex poliovaccin under pågående behandling. Kontakta din behandlande mottagning vid frågor och funderingar.
- Rådgör alltid med behandlande läkare innan ditt barn tar andra läkemedel än de som läkaren har ordinerat.

Sår och blåsor i munnen/läppar

Det är viktigt med god munhygien, borsta barnets tänder morgon och kväll. Kontakta din behandlande mottagning om barnet får munsår eller blåsor eller klagar på smärta vid måltider.

Hållbarhet

Xaluprine® oral lösning är hållbar 56 dagar i rumstemperatur efter öppnandet.