



Innehållet i denna instruktion är endast avsett som utbildningsmaterial för familjer som ingår i det forskningsprojekt som leds av apotekare Ranaa Akkawi El Edelbi vid Barnläkemedelsgruppen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Stockholm 20200604, ePed©

Talidomid kapslar

Talidomid används för att behandla vissa cancertyper. Det hjälper kroppens immunförsvar att stoppa tillväxt och överlevnad av cancerceller.

Om du har frågor eller funderingar var god kontakta din behandlande mottagning.

Råd innan hantering av läkemedlet

- Om du är gravid ska du undvika att komma i kontakt med talidomid.
- Talidomid kan göra ditt barn trött och sömngigt, tas med fördel vid sänggående.
- Talidomid bör tas på tom mage (1 timme före eller 2 timmar efter mat). Om ditt barn har en känslig mage kan läkemedlet ges med mat. Låt ditt barn dricka vätska i samband med samt efter intag av läkemedlet.

Biverkningar

Ditt barn kan drabbas av biverkningar under behandling med talidomid. Om nedanstående biverkningar blir värre, inte försvinner/inte blir bättre med tiden och påverkar ditt barns allmäntillstånd kontakta din behandlande mottagning.

- Yrsel
- Huvudvärk
- Torr hud
- Förstoppning

- Skakningar
- Ångest

Kontakta läkaren eller sök akutvård

Om ditt barn får svårare biverkningar t.ex. feber, illamående, kramper, influensaliknande symptom, känselbortfall, ryggsmärta, blod i urinen, andningssvårigheter eller allergisk reaktion kontakta läkaren omgående eller sök akutvård.

Övrig viktig information

Förebygg förstoppning genom att ge ditt barn fiberrik mat samt öka vätskeintaget. I vissa fall kan det vara bra att ge läkemedel mot förstoppning. Rådgör med behandlande mottagning vad som gäller för just ditt barn.