



Lidokain lokalbedövning av yta

(Xylocain) spray 10 mg/dos = 100 mg/mL

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Xylocain kutan spray 100 mg/mL

ADMINISTRERING

Lokalbedövning av yta

För administrering finns både korta och långa sprayrör. Sprayrören får inte kortas av ytterligare, då förstörs funktionen. De är böjda till sin slutgiltiga form och bör inte böjas ytterligare. Sprayrören är avsedda för engångsbruk.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Xylocain (registrerad produkt)

100 mg/mL, Kutan spray, lösning

För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

Förpackning förvaras i rumstemperatur och i skydd mot kyla. Förvaring under 8 °C kan ge utfällning som löser sig vid uppvärmning till rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Lokal smärtlindring, ytanestesi

Barn 2 - 3 år: 2 - 20 sprayningar (10 mg/spraydos)

Max 1,5 mg/kg (laryngotrakealt)

Barn över 3 år: 2 - 20 (- 40) sprayningar (10 mg/spraydos)

Max 3 mg/kg (laryngotrakealt), max 4 - 5 mg/kg (nasalt/orofaryngealt)

ÖVRIG INFORMATION

Använd inte på endotrakealtubers kuffar i plast. Kuffarna kan skadas av lösningen med risk för läckage.

10 sprayningar = 1 mL innehåller totalt 231 mg etanol. Detta motsvarar ca 2 mL vin.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll 2021-11-03

ePedID: 1198

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-11-10

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-11-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT