



## Lidokain utvärtes gel 2 %

(Xylocain)

### ADMINISTRERING

Lokalt: Kan appliceras via medföljande sprutspets eller urinkateter.

Effekt uppnås inom ca 5 min, effektiv ytanestesi kvarstår ca 20 - 30 min.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Xylocain (registrerad produkt)

2 %, Gel

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förfyllda sprutor är okonserverade, sparas ej. Tuben innehåller konserveringsmedel, hållbar max 7 dagar till flera patienter och max 21 dagar till enskild patient efter första öppnandet.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Behov av lokal smärtlindring

Individuell dosering. Vid val av dos, beakta längden på uretra, kroppsvikt och procedur. Speciellt till nyfödda bör minsta möjliga dos användas. Effekt uppnås inom ca 5 min, effektiv ytanestesi kvarstår ca 20 - 30 min.

Nyfödda: max 0,3 mL/kg = max 6 mg lidokain/kg

Max 4 gånger/DYGN

Barn 1 mån - 12 år: max 0,3 mL/kg = max 6 mg lidokain/kg

Max 4 gånger/DYGN

Barn från 13 år: brist på riktvärden för barn över 12 år.

Max 0,3 mL/kg = max 6 mg lidokain/kg

Beakta även riktvärden för vuxen: 20 mL för manlig uretra, 5 - 10 mL för kvinnlig uretra.

Max 4 gånger/DYGN

### ÖVRIG INFORMATION

1 mL = 1 gram gel innehåller 20 mg lidokainhydroklorid.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Neonatal Formulary

Rekommendation , (Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 1199

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-04-06

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**