



# Nevirapin oralt 10 mg/mL

(Viramune) oral suspension

**Nevirapin kan orsaka svår leverskada, svåra hudreaktioner och/eller överkänslighetsreaktioner.**

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd oral suspension 10 mg/mL.

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Suspensionen ska skakas innan varje administrering.

Oralt

Enteralt i sond

## RIMLIG DOS för Nevirapin oralt 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mg/kg	0,2 mL	1 mL	-	-
5 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	-	-
7 mg/kg	-	3,5 mL	7 mL	-
max 200 mg	-	-	-	20 mL

  

	0,1 m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>	0,5 m <sup>2</sup>	1,5 m <sup>2</sup>
120 mg/m <sup>2</sup>	1,2 mL	3 mL	6 mL	18 mL
200 mg/m <sup>2</sup> , max 200 mg	2 mL	5 mL	10 mL	20 mL

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Viramune (registrerad produkt)

10 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska är hållbar 6 mån.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordinerars i samråd med infektionsspecialist.

### Post-expositionsprofylax mot HIV-infektion i samband med födelse, vid behov av förstärkt behandling

Nyfödda: 2 mg/kg som engångsdos vid 48 - 72 timmars ålder

Om modern inte hunnit få nevirapin senast 2 timmar före förlossningen ges dessutom en extra dos om 2 mg/kg till barnet omedelbart efter födseln.

Som del i profylaktisk kombinationsbehandling:

Behandlingsdag 1 - 7: 2 mg/kg x 1

Behandlingsdag 8 - 14: 4 mg/kg x 1

När nevirapin ges som del i kombinationsbehandling kan administreringen påbörjas samtidigt som övriga preparat. Nevirapin ges i 2 veckor, övriga preparat i 4 veckor.

### Behandling av HIV-infektion

Nyfödda och barn under 2 mån:

Initialt 5 mg/kg x 1 eller 120 mg/m<sup>2</sup> x 1 i 14 dagar,

sedan 5 mg/kg x 2 eller 120 mg/m<sup>2</sup> x 2 i 14 dagar. Därefter 200 mg/m<sup>2</sup> x 2.

Barn 2 mån - 8 år:

Initialt 120 mg/m<sup>2</sup> x 1, max 200 mg/dos, i 14 dagar.

Om inte hudutslag eller andra oönskade bieffekter uppkommer ökas dosen till 7 mg/kg x 2 eller 200 mg/m<sup>2</sup> x 2, max 200 mg x 2.

Barn 9 - 18 år:

Initialt 120 mg/m<sup>2</sup> x 1, max 200 mg/dos, i 14 dagar.

Om inte hudutslag eller andra oönskade bieffekter uppkommer ökas dosen till 4 mg/kg x 2 eller 120 mg/m<sup>2</sup> x 2, max 200 mg x 2.

Om hudutslag uppkommer under den första insättningsperioden på 14 dagar ska dosen inte ökas förrän utslagen försvunnit. Om utslagen inte försvunnit inom 28 dagar ska en alternativ behandling sättas in.



# Nevirapin oralt 10 mg/mL

(Viramune) oral suspension



## ÖVRIG INFORMATION

Nevirapin är i första hand ett NNRTI-alternativ till barn under 3 år. För barn över 3 år har efavirenz visat sig vara effektivare.

Risken för svåra hudreaktioner, inklusive bl.a. Stevens-Johnsons syndrom, och allvarlig hepatit/leversvikt är störst under de första 6 behandlingsveckorna, men kan även komma senare. Patienten bör monitoreras noggrant under de första 18 veckorna. Behandlingen måste avbrytas, och inte återinsättas, om patienten får svåra hudutslag, hudutslag med allmänpåverkan, andra svåra överkänslighetsreaktioner eller allvarlig leverpåverkan.

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAV, Referensgruppen för antiviral terapi - Antiretroviral behandling av HIV-infektion

<http://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV>

Internetadress RAV, Referensgruppen för antiviral terapi - Profylax och behandling vid graviditet hos HIV-1 infekterade kvinnor

<http://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV>

Micromedex

NeoFax

Rekommendation ,(Grade 1B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#1201](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1201)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-06-27

ePedID: 1201

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-07-03

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-07-03

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**