



Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdig lösning med tillsatser.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Långsam intravenös injektion under 5 - 10 min

Intravenös infusion under 30 - 60 min.

Vid akut acidosis kan 25 - 50% av dosen ges under 5 - 10 min, med resterande dos under 1 timme.

Tribonat ska helst administreras i central ven, men stor perifer ven går också bra.

Extravasering kan orsaka svår vävnadsskada.

ÖVRIG INFORMATION

Ska ej ges till patienter som är anuriska eller uremiska.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Tribonat (registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Öppnad förpackning: 24 tim kyl, 12 tim rumstemp

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Metabol acidosis

Nyfödda:

1 mmol/kg = 2 mL/kg alternativt

dosering efter blodgas:

dos (mL Tribonat) = 0,3 - 0,5 (- 1) mL x vikt (kg) x BE

Barn 1 mån - 18 år:

Buffring kan övervägas vid långvarigt cirkulationsstillstånd och vid säkerställd grav acidosis.

0,5 - 1 mmol/kg = 1 - 2 mL/kg alternativt

dosering efter blodgas:

dos (mL Tribonat) = BE x vikt (kg) / 4

REFERENS/LÄNK

Micromedex

Rekommendation (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sl.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1208

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-06-13

ePedID: 1208

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-06-27

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-06-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT